類證活人書

附釋音辨誤藥性

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

類證活人書

附釋音辨誤藥性

(一)

朱肱撰

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

類證活人書序

傷寒諸家方論不一。獨伊尹仲景之書。猶六經也。其餘諸子百家。時有一得。要之不可爲法。又況邪說妄意。世業名家。規利雖厚。因果歷然。特以伊尹湯液。仲景經絡。常人難曉。士大夫又以藝成而下。恥而不讀。往往倉卒之際。束手待盡。卒歸之於命而已。世人知讀此書者亦鮮。縱欲讀之。又不曉其義。況又有好用涼藥者。如附子硫黃。則笑而不喜用。雖隆冬使人飲冷水三黃圓之類。有好用熱藥者。如大黃芒硝。則畏而不敢使。雖盛暑勸人炙煏服金液丹之類。非不知罪福。偏見曲說。所趣者然也。陽根於陰。陰本於陽。無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。是故春時氣溫。當將理以涼。夏月盛熱。當食以寒。君子扶陰氣以養陽之時也。世人以爲陰氣在內。反抑以熱藥。而成瘡痢。脫血者多矣。秋時氣涼。當將息以溫。冬時嚴寒。當食以熱。君子扶陽氣以養陰之時也。世人以陽氣在內。乃抑以涼藥。而成吐痢腹痛者多矣。伐本逆根。豈知天地之剛柔。陰陽之逆順。求其不夭橫也難矣。偶有病家。曾留意方書。稍別陰陽。知其熱證。則召某人。以某人善醫陽病。知其冷證。則召某人。以某人善醫陰病。往往隨手全活。若病家素不曉者。道聽泛請。委而聽之。近世士人。如高若訥、林億、孫奇、龐安常皆惓惓於此。未必章句之徒不諳且駭也。僕因閒居。作爲此書。雖未能盡窺伊尹之萬一。庶使天下之大人無夭伐。老不哭幼。士大夫易曉而喜讀。漸浸積習。人人尊生。豈曰小補之哉。仲尼曰。吾少也賤。故多能鄙事。學者不以爲鄙。然後知余用意在此而不在彼。大觀元

年正月日前進士朱肱序

僕乙未秋以罪去國明年就領宮祠以歸過方城見同年范內翰云活人書詳矣比百問十倍然證與方分爲數卷倉卒難檢耳及至濉陽又見王先生活人書京師京都湖南福建兩浙凡五處印行惜其不曾校勘錯誤頗多遂取繕本重爲參詳改一百餘處命工於杭州太隱坊鏤板作中字印行庶幾緩急易以檢閱然方術之士能以此本游諸聚落悉爲改證使人讀誦廣說流布不爲俗醫妄投藥餌其爲功德獲福無量政和八年季夏朔朝奉郎提點洞霄宮朱肱重校證

類證活人書序

武夷張　藏

余頃在三茅。見無求子傷寒百問。披而讀之。不知無求子何人也。愛其書。想其人。非居幽而志廣、形愁而思遠者。不能作也。惠民憂國。不見施設。游戲藝文。以閱歲月者之所作乎。逃世匿跡。抗心絕慮。灌園荒丘。賣藥都市者之所作乎。顛倒五行。推移八卦。積功累行。以就丹竈者之所作乎。不然。則窮理博物。觸類多能。東方朔者耶。浩歌散髮。採掇方技。皇甫謐者耶。周流人間。衞生救物。封君達者耶。前非古人。後無作者。則所謂無求子者。余不得而知也。三茅三年。挾册抵掌。未嘗停手。所藉以全活者。不知其幾人也。惜其論證多而說脈少。治男子詳而婦人略。銖兩訛舛。升斜不明。標目混淆。語言不通俗。往往閭閻有不能曉者。此余之所以夙夕歎然者也。今秋遊武林。邂逅致政朱奉議。泛家入境。相遇於西湖之叢林。因論方士。奉議公乃稱賈誼云。古之人不在朝廷之上。必居醫卜之中。故嚴君平隱於卜。韓伯休隱於醫。然卜占吉凶。醫有因果。不精於醫。寧隱於卜。班固所謂有病不治得中醫。蓋慎之也。古人治傷寒有法。治雜病有方。葛稚川作肘後。孫眞人作千金。陶隱居作集驗。元晏先生作甲乙。率著方書。其論傷寒活法者。長沙太守一人而已。華陀指張長沙傷寒論爲活人書。昔人又以金匱玉函名之。其重於世如此。然其言雅奧。非精於經絡。不可曉會。頃因投閒。設爲對問。補苴綴緝。僅成卷軸。因出以相示。然後知昔之所見百問。乃奉議公

所作也。因乞其繕本校其詳略。而傷寒百問。十得五六。前日之所謂歉然者。悉完且備。書作於己巳。成於戊子。增爲二十卷。釐爲七册。計九萬一千三百六十八字。得此書者。雖在崎嶇僻陋之邦。道途倉卒之際。據病可以識證。因證可以得方。如執左契。易如反掌。遂使天下傷寒。無橫夭之人。其爲饒益不可思議。昔樞密使高若訥、作傷寒纂類。翰林學士沈括、作別次傷寒。直祕閣胡勉、作傷寒類例。殿中丞孫兆、作傷寒脈訣。蘄水道人龐安常、作傷寒卒病論。雖互相發明。難於檢閱。比之此書。天地遼落。張長沙南陽人也。其言雖詳。其法難知。奉議公祖述其說。神而明之。以遺惠天下後世。余因揭其名爲南陽活人書云。大觀五年正月日敍。

青詞

竊以神農嘗藥。伊尹論方。證順陰陽。雖克求於民瘼。時無疫癘。蓋有賴於神休。瞻彼旻穹。哀此黎庶。伏念臣浪遊東土。空閱流光。蔑聞經國之謀。端議濟人之術。冥冥長夜。憐橫死之無辜。斷斷窮年。矧餘生之多病。自朝及夕。考古驗今。首尾幾二十一年。前後僅九萬餘字。焦心皓首。編筆青編。原其微功。實自潛祐。屬成書之將上。爰奏牘以先天。恭卽蘭場。肆陳醮席。冀九清之降鑒。祈萬宇於康寧。仰獲證明。庶傳永久。臣無任懇禱之至。

進表

臣聞鍾山非矯。幽人躡屩於深林。衡岳雖遙。志士獻書於北闕。蓋行藏之有數。非狂狷所能知。中謝伏念

臣出自蔀屋之微。嘗奉大廷之對。昔爲冗吏。今作閒人。乃因三餘。著成百問。上稽伊尹湯液之論。下述長沙經絡之文。詮次無差。搜羅殆盡。從微至著。蓋不可加。亘古及今。實未曾有。載在簡册。圖之丹青。思欲膠口而不傳。大懼利己而無益。恐先朝露。虛棄寸陰。學古入官。既無裨於國論。博施濟衆。庶或廣於仁風。伏惟皇帝陛下。經緯之文。出自天縱。紀綱之治。成於日躋。疆宇開拓於版圖。弦歌洋溢乎天下。棲神內景。屬意生民。收拾人材。凡片善寸長。皆有所用。勤卹民隱。雖沉痾垂老。各安其居。玉燭亘天。以流離朱草填廷。而委積滿廒。沛溫詔下寧。致茲丘園一介之愚。亦効涓埃萬分之助。蔵明大道。敷奏彌文。楊雄所懷。以既章。蔡澤沒齒而無憾。重惟道途脩阻。巾笈讜持。未免客嘲。焉令鬼泣。顧因果之有在。茲俯仰而不慚。儻合宸衷。自鞏輿議。特藴縻於丹竈。徒景仰乎公車。謹遣男遺直齎所撰書一函八册。共二十卷。躬詣檢院。投進以聞。委有覩采。伏乞宣付國子監印造頒行。如臣學植淺陋。違戾於經。卽乞委官參詳。然後布之天下。以福羣生。臣無任干天冒聖。激切屏營之至。

政和元年正月一日。奉議郎致仕臣朱肱謹上。

謝啓

命出于中。恩歸有自。藝成而下。唯濟世可以無嫌。祿在其中。苟爲貧有何不可。如肱者。矍聃遮眼。醫卜藏身。十載投閒。憐桑麻之已長。一朝就列。媿松菊以難存。方將穿墨池以灌園。安丹竈而息火。掃除伎倆。淘汰因緣。不虞湯液之言。偶合春秋之法。道俗交慶。魚鳥亦驚。龍光祗荷於殊恩。陶冶實資於大化。此蓋伏遇太師相公。無心造物。有意爲民。以人物升沉爲深憂。以世諦俯仰爲可媿。苟有一得。不問其他。致茲流

落之餘。亦在使令之數。敢不激昂晚節。箴策下愚。稽首傾心。豈特平日之師仰。斷臂抉目。蓋將投老以依歸。

類證活人書釋音

身體類

脇虛業切・與脅同・
咽於肩切・咽候也・
頰惡葛切・鼻莖也・
膈古核切・胸膈也・
嗌於亦切・咽也・
膕音牝・或作牝・膝骨端也・
踹市兗切・脚跟也・
腋羊益切・肘腋・
脛胡定切・腸前骨也・腓
膊音博・肩也・

嚨力公切・喉嚨也・
踝胡瓦切・足踝也・
顱力胡切・鼻莖也・
肋魯得切・脅骨也・
脽尸當切・說文曰・脛端也・
頏苦浪切・咽也・
筋舉欣切・或作筋・
眥才賜・才詣切・目際也・
溺與尿同音義・
胛音甲・背胛・

膕戈麥切・曲脚也・
髀補爾切・股也・
頰居協切・面旁也・
睭之劣切・面秀骨・
脅力佇切・脊骨也・
顙寫冀切・額也・
顯顯仁千切・顯耳前動・
溲所留切・小便也・
鼾下旦切・臥息也・
胯口故切・跨・股也・亦作

[illegible]時兗切・[illegible]脛踝也・
頸項也・胡郢切・
頷戶感切・頤下也・
脘古卯切・骨脘也・
跟古痕切・足踵也・
巔多年切・上曰巔・頂
腠倉奏切・膚腠也・
尿乃弔切・小便也・
尻苦蒿切・說文曰・臗也・臗也・
腓房非切・

髦音毛・鬣也・
跗方俱切・足上也・跗
臀徒昆切・
娠音申・

膜蜜各切・肉間膜也・
趺與跗同・
顳仁涉切・
鼠鼷下音奚・鼠鼷穴・

臍在奚切・
肛許江切・
骭苦瓦切・脾骨・亦作髁・
竅口弔切・穴也・空心・

病證類

疼徒冬切・痛也・
澁所力切・不滑也・
攣力全切・易有孚攣如・
悸其季切・心動也・

喘充兗切・疾息也・
痫玄間切・小兒瘨病也・
瞤如倫切・動也・
脹猪亮切・張滿也・

痰徒甘切・胸上水病也・
喝許葛切・熱貌・
怫扶勿切・不舒也・
燥先到切・乾也・

瘀於豫切・血也・
跲具員切・踠不伸也・跲
欬口戴切・嗽也・

淫曷各切・竭也・
憒公對切・心亂也・
瘨之忍切・皮外小起也・
疟許久切・病也・

嘻於飯切・笑也・
鼆女力切・肛蟲也・貪
鞕牛更切・亦作硬・
痏恥刃切・正作疢・

痛補被・平几二切・腹內結病・
澀壯士切・汗出貌・
躁則到切・正作趮・
瘡之忍切・同義・瘢

瘁餘兩切．又音羊．亦作悴．痛痒也．

瘛兒至切．惡也．

瘨都賢切．狂也．

噦於月切．逆氣也．又乙芮切．

噎所訝切．聲破也．

癖匹辟切．食不消．

噤巨錦、巨禁二切．說文曰．口閉也．

恍火廣切．

怔忡上之成切．下敕容切．心動不定而驚．

痓音注．

瞬式閏切．目動也．

譫之閻切．多言也．

噫乙七、乙介二切．飽出息也．

沈持林切．亦作湛．

擗脾役切．拊心也．

痙渠井、巨郢二切．風強病也．

愊拍逼切．

愶呼骨切．

瘧魚略切．或寒或熱也．

眩音縣．

蝕音食．

咳苦代切．

瘧上之陵切．下公遐、公詐二切．女病也．腹中結病也．

瘈或從心．尺世、胡計二切．小兒病也．

瘛丁佐切．勞病也．徒丹切．風在手也．丁寒切．小兒病也．

豌於尤切．豆也．

膶充人切．起也．埤蒼云．引起也．

疸多旱切．黃病也．

皴七旬切．皮細起也．

齘何介切．禁齘．切齒怒也．

滲所禁切．

蚘胡恢切．亦作蛔．腹中長蟲．

晼於月切．同曉義．

疱薄教切．疱瘡也．

喉何猛切．語為人所忽疑也．

癰於恭切．癰腫也．

讞女監切．

惕他的切．

咬五巧切．

搐音蓄．

衄或作衂．尼六女六二切．鼻出血也．

否蒲鄙切．

利差下去聲。餘同。

懊憹上於到、於六二切。下音農。

扎菁侯切。徐氏服訣云。按之即無。舉之來至。兩傍實中央空者爲扎。

藥名類

蠣力制切。蚌屬。

葳於危切。

茜此先切。說文曰。茅蒐可以染緋。

麫忌俱切。麴麥。

莢吉協切。

芩渠炎、渠今二切。黃芩。

蛤古令切。雀入水爲蛤。

芫牛遠切。芫花。

芎藭上丘弓切。下渠弓切。

蠍許謁切。蝎人蟲。

豆蔻下許候切。

穬如羊切。

檗博厄切。黃木也。正作蘗。

豭古牙切。豕也。

茹如倨切。

殼克角切。釋云皮甲也。或作殼。

蠹之夜切。蟲名。亦作蠆。

葅間燭切。葅豆。

桔梗上居屑切。下古杏切。

瓤音穰。瓜實也。

蒂丁計切。瓜當也。或作蔕。

蕖古老切。亦作槁。

豉是義切。

枳諸氏切。淮北爲枳。橘踰

蛆之吉、二結二切。水蛾。

飴盈之切。餳也。

茵蔯下音陳。上於仁切。

殺音古。牡曰羖。

荏如甚切。菜也。

螵蛸上蒲霄切。下相邀切。螳螂也。

赭音者。

煤莫杯切。煙塵也。

核下革切。

薤下戒切。葷菜也。葉似韭。

泔音甘。米潘也。

蝨莫庚切。蝨蟲。

葶藶上音亭。下音歷。

麩芳無切。麥皮。

獯符分切。豕也。

蒺藜上慈栗切。下良脂切。

薷音柔。

連翹所遙切。

蜣蜋上丘良切·下力當切·啖糞蟲·

薤音邂·

麥蘗魚列切·

萎蕤上於危切·下汝誰切·

製鍛類

鍊郎甸切·亦作煉·

炊昌爲切·

咳咀上音雨下音沮

煻徒郎切·煨火·

剉寸臥切·

歠昌悅切·大飲也·

撮牳括切·

漉力木切·

蒴音朔·

梔子上音枝·

薑荊子葍、母干切·

鎊音滂·劖也·

鍛多亂切·

熆廣韻作瘍·虛業切·火氣騰上·

烊亦章切·焙烊·

絞古巧切·

餤都濫切·亦作啗啖·

呷呼甲切·吸也·

滓壯士切·

鉤藤徒登切·

芒硝上音亡·下音消·

煤讀杯切·

牛蒡子蒡音榜·

薏苡上乙吏切·下余止切·

溺音尿·

竹瀝下狊切·

薨北燒切·薨花·

熚與熱同·燒也·

摻所斬切·

攪古巧切·亂也·

黕與曜同·音義·

攦他干切·

劑才詣切·

拌音伴·

器用類

蓁 疾資切。瓦器。

匕 必以切。

秤 昌孕切。權衡也。

篩 霜夷切。竹器。亦作簁。

拾遺類

灸 居又切。灼也。

撲 普鹿切。

隧 音遂。通道也。掘地

摸 慕各切。摸索。

溜 力救切。

沫 音末。沫也。水

甑 子孕切。

蓐 儒欲切。草蓐。又藁也。

鍼 之林切。亦作針。

箆 邊迷切。

辰 匹賣切。

診 音軫。視也。釋云候脈。

諦 都計切。審也。

緻 音治。密也。

捩 力計切。拗捩也。

鶩 音木。鳧也。

錘 直垂切。權也。又鍛義。

罐 古玩切。汲水器。

桲 音數。

液 音亦。津液。又渴液。

駃 山吏切。疾也。

虺 呼鬼切。

晬 子對切。周時也。

蠆 丑介切。蠍蟲。

斃 音弊。

銚 徒弔切。燒器。

銖 市朱切。

櫛 側瑟切。笊籬之總名。

騁 丑郢切。馳也。

摘 直隻切。

膻 徒旱切。說文。肉臛也。

豁 壹計切。

俠 音叶。

慕 音暮。

類證活人書辨誤

（二）桂枝麻黃各半湯內
芍藥捌錢當用伍錢。　甘草捌錢炙當用伍錢炙。

（三）桂枝二麻黃一湯內
桂枝捌錢半當用捌錢叁字。
芍藥伍錢半當用陸錢壹字。
麻黃叁錢壹字當用叁錢叁字。
甘草貳分半當用伍錢壹字。

（四）桂枝二越婢一湯內
石膏陸錢當用叁分。

（十三）桂枝加大黃湯內
大黃貳兩當用壹兩。

（三十一）柴胡桂枝湯內
半夏貳分半當用肆錢壹字。

(三十二)柴胡桂薑湯內

柴胡壹兩(當用肆兩)・

(三十三)柴胡加龍骨牡蠣湯內

柴胡壹兩(當用貳兩)・　黃芩壹兩(當用叁分)・

半夏半合(當用陸錢壹字)・　大黃半兩(當用壹兩)・

龍骨壹兩(當用叁分)・　牡蠣壹分半(當用叁分)・

類證活人書傷寒藥性 注中有括弧者・神農本經・無括弧者諸家說・

▲玉石部

代赭寒無毒・
滑石(寒)大寒無毒・
信砒信州砒霜・溫有毒・
太陰石
礬石(寒)無毒・
雄黃(平寒)大溫有毒・
消石(寒)大寒無毒・
金箔平無毒・生金有毒・
太陽石
勞水又名礬水・
赤消無毒・消石生於赤山・
竈突墨無毒・
禹餘糧(寒平)無毒・
鉛丹(微寒)
硫黃(溫)大熱有毒・
太陰玄精溫無毒・
赤石脂大溫・
釜底煤無毒・
芒硝大寒・
雌黃(平)大寒無毒・
梁上塵微寒無毒・
玄精石
水銀(寒)有毒・
石膏(微寒)大寒有毒・

▲草部

甘草(平)無毒・
柴胡(平)微寒無毒・
山茵蔯(平)微寒無毒・
防風(溫)無毒・
人參(微寒)微溫無毒・
麥門冬(平)微寒無毒・
芎藭(溫)無毒・
蓯蓉(微溫)無毒・
天門冬(平)大寒無毒・
澤瀉(寒)無毒・
黃連(寒)微寒無毒・
木香青木香・溫無毒・
牛膝(平)無毒・
升麻(平)微寒無毒・
乾地黃(寒)無毒・生者大寒・
茜根(寒)無毒・

乾薑(溫)大熱無毒・
五味子(溫)無毒・
菖蒲(溫)無毒・
當歸(溫)大溫無毒・
芍藥(平)微寒有小毒・
知母(寒)無毒・
熟艾(溫)無毒・
常山(寒)有毒・微寒
天雄(溫)大溫・有大毒・
玄參(微寒)無毒・
前胡(微寒)無毒・
蒺藜子(溫)微寒無毒・

薏苡仁(微寒)無毒・
黃耆(微溫)無毒・
生薑微溫・
麻黃(溫)微溫無毒・
百合(平)無毒・
牡丹(寒)微寒無毒・
葉本(溫)微溫微寒無毒・
茅花(溫)無毒・
桔梗(微溫)有小毒・
附子(溫)大熱・有大毒・
商陸(平)有毒・
葶藶(寒)大寒有毒・
白頭翁(溫)無毒有毒・

葛根(平)無毒・
細辛(溫)無毒・
栝樓子冷無毒・
瞿麥(寒)無毒・
貝母(平)微寒無毒・
白薇(平)大寒無毒・
石葦(平)無毒・
大黃(寒)大寒無毒・
烏頭(溫)大熱・有大毒・
連翹(平)無毒・
甘遂(寒)大寒有毒・
旋覆花(溫)微冷利有小毒・
艾汁(微溫)無毒・
澤漆微寒無毒・

萎蕤(平)無毒・
獨活羌活附・(平)微溫無毒・
苦參(寒)無毒・
通草木通(平)無毒・
白芷(溫)無毒・
紫苑(溫)無毒・
蜀漆(平)微溫有毒・
半夏(平)生微寒・熟溫有毒・
海藻(寒)無毒・
大戟(寒)大寒有毒・
白藥子(溫)無毒・又云冷・
黃芩(平)寒無毒・
地榆微寒無毒・
栝樓根(寒)無毒・

京三稜（平）無毒。
高良薑大溫。

▲木部

槐子（寒）無毒。
竹葉（平）大寒無毒。
蔓荊子（微寒）平。溫無毒。
檳榔溫無毒。
芫花（溫）微溫。有小毒。
梓白皮（寒）無毒。
茶微寒無毒。
杜仲（平）溫無毒。

▲人部

小便涼。又云寒。

▲獸部

褫襠本草不載其性。

華澄茄溫無毒。
射干一名烏扇。微溫有毒。（平）

桂枝大熱。小有毒。
五加皮（溫）微寒無毒。
猪苓（平）無毒。
厚朴（溫）大溫無毒。
訶子皮溫。無毒。
竹茹微寒。
秦皮（微寒）大寒無毒。
蜀椒川椒。（溫）大熱有毒。

青葙子（微寒）無毒。
大青大寒無毒。

茯苓（平）無毒。
黃蘗（寒）無毒。
枳實（寒）微寒無毒。
大腹皮微溫無毒。
皂莢（溫）有小毒。
紫葳（微寒）無毒。
巴豆（溫）生溫熟寒有毒。

天南星（平）有毒。
白朮蒼朮本草不分二藥性。但總云朮（溫）無毒。

酸棗仁（平）無毒。
梔子（寒）大寒無毒。
海桐皮平。無毒。
沙木溫。無毒。
枳殼微寒無毒。
茱萸吳茱萸。（溫）大熱有小毒。
沉香微溫。

麝香（溫）無毒。
鼠屎微寒涼。無毒。

▲禽部

雞子平微寒。無毒。

▲蟲魚部

蜂窠（平）有毒。
鼠婦（溫）微寒。無毒。
五靈脂（溫）無毒。
蝨蟲（平）有毒。

龍骨（平）微寒。無毒。
犀角（寒）微寒無毒。

阿膠（平）微溫。無毒。
羖羊角（溫）微寒。無毒。

牡蠣（平）微寒。無毒。
蜜（平）微溫。無毒。
蜣螂寒。有毒。

水蛭平。微寒。有毒。
文蛤平。無毒。
乾蝎平。有毒。

豬膽微寒。

龜甲（平）無毒。
螢火微溫無毒。
蜜蟲（寒）有毒。

▲菓部

橘皮（溫）無毒。
桃仁（平）無毒。
荷葉本草不著荷葉性。據藕實莖性。（平）寒無毒。

棗子（平）無毒。
李根白皮大寒。

烏梅煖。無毒。
杏仁（溫）冷利有毒。

木瓜溫。無毒。
橘葉本草不著橘葉性。據橘柚性。（溫）無毒。

▲米穀部

麻人毒（平）無　粳米毒平・無　赤小豆毒平・無　小麥微寒・無毒・

膠飴微溫・　酒大熱・有毒・　豉寒・無毒・　又名苦酒・醋無毒・

▲菜部

瓜蒂毒（寒）有　韭根溫・毒・無　香薷微溫・無毒・　荊芥溫・毒・無

紫蘇溫・　葱白平・　薤白冷・毒・無　連鬚葱白寒・

婦人藥性

海蛤毒（平）無　蘇木毒平・無　伏龍肝微溫・熱・微毒・又注云・　桑白皮（寒）毒・無

桑寄生毒（平）無　蜀漆葉微溫・有毒・　蘆根寒・毒・無　宣連宣州黃連・性同前黃連・

（以下小兒藥性一門明刊本原缺）

類證活人書目錄

卷之一

經絡圖　太陽經　陽明經　少陽經　太陰經　少陰經　厥陰經
（一）問傷寒一二日發熱惡寒頭項痛腰脊強尺寸脈俱浮　（二）問傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥其脈尺寸俱長　（三）問傷寒三四日胸脅痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脈俱弦　（四）問傷寒四五日腹滿咽乾手足自温或自利不渴或腹滿時痛尺寸脈俱沉細　（五）問傷寒五六日口燥舌乾而渴或口中和而惡寒尺寸脈俱沉　（六）問傷寒六七日煩滿而囊縮其脈尺寸俱微緩

卷之二

脈穴圖　氣口脈　人迎脈　衝陽脈　太谿脈　風池穴　風府穴　期門穴　關元穴
（七）問三部之位　（八）問診候之法　（九）問脈息之證　（十）問七表　（十一）問八裏
（十二）問脈按之來緩時一止復來又脈來動而中止不能自還因而復動

卷之三

（十三）問表證（三陰可表證汗後有表證下後有表證）　（十四）問裏證（三陰可下證）　（十五）問表裏兩證俱見　（十六）

問無表裏證　(十七)問病人有身大熱反欲得衣有身大寒反不欲近衣者

卷之四

(十八)問陰證　(十九)問陽證　(二十)問手足逆冷臍腹築痛咽喉疼嘔吐下利身體如被杖或多汗煩渴脈細欲絕　(二十一)問發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃而脈息洪實　(二十二)問病人潮熱獨語如見鬼狀發則不識人尋衣撮空直視微喘　(二十三)問胸膈不快膨滿閉塞面色及脣白手足冷脈沉細少情緒及腹痛　(二十四)問脈微細欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴　(二十五)問身體微熱煩躁面赤其脈沉而微　(二十六)問手足逆冷而大便祕小便赤或大便黑色脈沉而滑　(二十七)問身冷脈細沉疾煩躁而不飲水　(二十八)問手足逆冷　(二十九)問吐長蟲　(三十)問身體重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花婦人則裏急腰胯連腹內痛

卷之五

(三十一)問冬謂之傷寒春謂之温病夏謂之熱病　(三十二)問三日已前當汗三日已後當下　(三十三)問陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈　(三十四)問仲景有發汗者有和解之者　(三十五)問仲景有宜下之者有微和其胃氣者　(三十六)問傷寒一日頭疼口乾煩滿而渴二日腹滿身熱不欲食讝語三日耳聾囊縮而厥水漿不入不知人

(三十七)問傷寒已經發汗吐下仍不解古人謂之壞病
卷之六
(三十八)問脈浮而緊濇頭疼身體拘急惡寒無汗寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手足指末微厥不煩躁　(三十九)問脈浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼惡風熱多寒少其面光而不慘煩躁手足不冷　(四十)問有發熱惡寒煩躁手足温而脈反浮緊者有寒多熱少不煩躁手足微冷而脈反浮緩者　(四十一)問夏月發熱惡寒頭疼身體支節痛重其脈洪盛者　(四十二)問夏月自汗惡寒身熱而渴其脈微弱者　(四十三)問夏至已前發熱惡寒頭疼身體痛其脈浮緊　(四十四)問病人先熱後寒脈尺寸俱盛　(四十五)問脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四肢不收嘿嘿但欲眠　(四十六)問一歲之中長幼疾狀多相似
(四十七)問一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快者　(四十八)問支體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫　(四十九)問兩脛逆冷胸腹滿多汗頭目痛苦妄言　(五十)問發熱惡寒頸項強急腰身反張如中風狀或瘈瘲口噤
卷之七
(五十一)問憎寒發熱惡風自汗寸口脈浮胸膈痞滿氣上衝咽喉不得息而頭不疼項不強
(五十二)問頭疼脈數發熱惡寒而身不痛左手脈平和　(五十三)問不惡寒身不痛頭不疼

脈不緊但煩熱　（五十四）問傷寒頭疼身熱支節痛大便祕或嘔逆而脚屈弱者

卷之八

（五十五）問發熱（陰證有發熱）　（五十六）問熱多寒少　（五十七）問潮熱　（五十八）問往來寒熱者陰陽相勝也陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒　（五十九）問傷寒如瘧狀　（六十）問汗之而寒熱者　（六十一）問汗之而仍發熱者　（六十二）問下之而熱不退者（勞復食復附）

卷之九

（六十三）問惡寒　（六十四）問惡風　（六十五）問傷寒不得汗　（六十六）問自汗　（六十七）問頭汗出　（六十八）問頭疼　（六十九）問身體痛（身痒附）　（七十）問筋惕肉瞤頭眩身搖　（七十一）問喘　（七十二）問渴　（七十三）問鼻衄　（七十四）問腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語遺尿

卷之十

（七十五）問心下緊滿按之石硬而痛　（七十六）問心下滿而不痛　（七十七）問嘔（乾嘔附）　（七十八）問吐　（七十九）問嘔吐而利　（八十）問欬嗽　（八十一）問咽喉痛　（八十二）問口燥咽乾　（八十三）問病人但漱水不欲嚥　（八十四）問不得眠　（八十五）問多眠　（八十六）問身涼汗出兩脅疼痛或乾嘔

卷之十一

（八十七）問欬逆　（八十八）問發黃　（八十九）問發狂　（九十）問發斑　（九十一）問讝語（上女監切）　（九十二）問吐血　（九十三）問腹痛（腹脹滿附）　（九十四）問煩躁　（九十五）問下利者　（九十六）問小便不利小便難　（九十七）問小便自利小便數　（九十八）問有數日不大便有大便難有大便鞕有燥屎有大便溏　（九十九）問病人默默欲眠目不能閉起居不安其聲嗄或咽乾（嗄所訝切聲破也）　（一百）問病人欲食復不能食當默默欲臥復不能臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不欲飯時如強健人而臥不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥入即吐利

卷之十一（以下計一百一十三方係正方各方具證治）

（一）桂枝湯　（二）桂枝麻黃各半湯　（三）桂枝二麻黃一湯　（四）桂枝二越婢一湯　（五）桂枝加桂湯　（六）桂枝加附子湯　（七）桂枝去芍藥湯　（八）桂枝去芍藥加附子湯　（九）桂枝去桂加茯苓白朮湯　（十）桂枝去芍藥加蜀漆牡礪龍骨救逆湯　（十一）桂枝加芍藥生薑人參新加湯　（十二）桂枝加芍藥湯　（十三）桂枝加大黃湯　（十四）桂枝甘草龍骨牡礪湯　（十五）桂枝甘草湯　（十六）桂枝人參湯　（十七）桂附湯　（十八）桂枝加葛根湯　（十九）桂枝加厚朴杏子湯　（二十）麻黃湯　（二十一）麻黃杏子甘草石膏湯

(二十二)麻黃附子甘草湯　(二十三)麻黃細辛附子湯　(二十四)麻黃連翹赤小豆湯
(二十五)麻黃升麻湯　(二十六)葛根湯　(二十七)葛根加半夏湯　(二十八)葛根黃芩黃連湯　(二十九)小柴胡湯

卷之十三

(三十)大柴胡湯　(三十一)柴胡桂枝湯　(三十二)柴胡桂枝乾薑湯　(三十三)柴胡加龍骨牡礪湯　(三十四)柴胡加芒硝湯　(三十五)大青龍湯溫粉法附　(三十六)小青龍湯
(三十七)小建中湯　(三十八)大陷胸湯　(三十九)大陷胸丸　(四十)小陷胸湯　(四十一)大承氣湯　(四十二)小承氣湯　(四十三)調胃承氣湯　(四十四)桃仁承氣湯
(四十五)梔子豉湯　(四十六)梔子甘草豉湯　(四十七)梔子生薑豉湯

卷之十四

(四十八)梔子厚朴湯　(四十九)梔子乾薑湯　(五十)梔子蘗皮湯　(五十一)茯苓桂枝甘草大棗湯　(五十二)茯苓桂枝白朮甘草湯　(五十三)茯苓甘草湯　(五十四)甘草湯
(五十五)甘草乾薑湯　(五十六)炙甘草湯　(五十七)芍藥甘草湯　(五十八)厚朴生薑半夏甘草人參湯　(五十九)大黃黃連瀉心湯　(六十)附子瀉心湯　(六十一)半夏瀉心湯　(六十二)甘草瀉心湯　(六十三)生薑瀉心湯　(六十四)白虎湯　(六十五)白虎加

人參湯　（六十六）五苓散　（六十七）猪苓湯　（六十八）附子湯　（六十九）桂枝附子湯
（七十）朮附湯　（七十一）甘草附子湯　（七十二）芍藥甘草附子湯　（七十三）乾薑附子
湯　（七十四）理中圓（理中湯附）　（七十五）四逆湯　（七十六）四逆散　（七十七）四逆加人參
湯　（七十八）茯苓四逆湯　（七十九）當歸四逆湯　（八十）當歸四逆加茱萸生薑湯

卷之十五

（八十一）通脈四逆湯　（八十二）通脈四逆加猪膽湯　（八十三）黃連湯　（八十四）黃連阿
膠湯　（八十五）黃芩湯　（八十六）黃芩加半夏生薑湯　（八十七）文蛤散　（八十八）三
物白散　（八十九）十棗湯　（九十）抵當圓　（九十一）抵當湯　（九十二）麻人圓　（九
十三）茵蔯蒿湯　（九十四）牡礪澤瀉散　（九十五）竹葉石膏湯　（九十六）枳實梔子湯
（九十七）白通湯　（九十八）白通加猪膽汁湯　（九十九）桃花湯　（一百）吳茱萸湯
（一百一）猪膚湯　（一百二）桔梗湯　（一百三）半夏散及湯　（一百四）苦酒湯　（一百
五）眞武湯　（一百六）烏梅圓　（一百七）乾薑黃芩黃連人參湯　（一百八）白頭翁湯
（一百九）赤石脂禹餘糧湯　（一百十）旋復代赭湯　（一百十一）瓜蒂散　（一百十二）蜜
煎導法　（一百十三）燒褌散

卷之十六

以下計一百二十六方係雜方各方具證治

（一）升麻湯　（二）防風白朮牡蠣湯　（三）李根湯　（四）大橘皮湯　（五）橘皮竹茹湯
（六）陰旦湯　（七）陰毒甘草湯　（八）白朮散　（九）附子散　（十）正陽散　（十一）肉桂散　（十二）回陽丹　（十三）返陰丹　（十四）天雄散（正元散退陰散附）　（十五）葱熨法　（十六）蔘蘆苦酒湯　（十七）陽毒升麻湯　（十八）大黃散　（十九）梔子仁湯　（二十）黑奴丸
（二十一）五積散　（二十二）霹靂散　（二十三）火焰散　（二十四）丹砂圓

卷之十七

（二十五）五味子湯　（二十六）鼷鼠糞湯　（二十七）竹皮湯（續添乾薑湯青竹茹湯當歸白朮湯附）　（二十八）知母麻黃湯　（二十九）鱉甲散　（三十）人參順氣散　（三十一）蒼朮散　（三十二）麻黃葛根湯　（三十三）敗毒散　（三十四）獨活散　（三十五）桂枝石膏湯　（三十六）梔子升麻湯　（三十七）橘皮湯　（三十八）解肌湯　（三十九）小柴胡加桂湯　（四十）白虎加桂湯
（四十一）柴胡桂薑湯　（四十二）瘧母煎　（四十三）祛邪圓　（四十四）猪膽雞子湯
（四十五）蒌蔞湯　（四十六）知母葛根湯　（四十七）栝樓根湯　（四十八）漢防己湯
（四十九）老君神明散　（五十）務成子螢火圓（續添聖散子附）　（五十一）調中湯　（五十二）射干湯
（五十三）半夏桂枝甘草湯　（五十四）麻黃杏子薏苡甘草湯　（五十五）防己黃蓍湯
（五十六）杏仁湯　（五十七）小續命湯　（五十八）附朮散　（五十九）桂心白朮湯　（六

十）附子防風散（六十一）八物白朮湯（六十二）柴胡半夏湯（六十三）金沸草散
卷之十八
（六十四）大半夏湯（六十五）越婢湯（六十六）脾約圓（六十七）黑神圓（六十八）神功圓（六十九）五柔圓（七十）大三脘散（七十一）檳榔散（七十二）薏苡仁酒法（七十三）木瓜散（七十四）葱豉湯（七十五）連鬚葱白湯（七十六）葛根葱白湯（七十七）雄鼠屎湯（七十八）黃芩芍藥湯（七十九）酒蒸黃連圓（八十）茅花湯（八十一）枳實理中圓（八十二）小半夏加茯苓湯（八十三）桔梗枳殼湯（八十四）赤茯苓湯（八十五）香薷散（八十六）犀角地黃湯（八十七）黃連解毒湯（八十八）酸棗湯（八十九）梔子烏梅湯（九十）橘皮乾薑湯（九十一）羌活附子湯（九十二）半夏生薑湯（九十三）黑膏方（九十四）葛根橘皮湯（九十五）玄參升麻湯（九十六）大青四物湯（九十七）知母桂心湯（九十八）三黃圓（九十九）桔梗半夏湯（一百）三黃熟艾湯（一百一）薤白湯（一百二）赤石脂圓（一百三）地楡散（一百四）黃連阿膠湯（一百五）桃花湯（一百六）黃連犀角湯（一百七）雄黃銳散（一百八）百合知母湯（一百九）滑石代赭湯（一百十）雞子湯（一百十一）百合洗方（一百十二）百合地黃湯（一百十三）栝樓牡蠣散（一百十四）滑石散（一百十五）治中湯（一百

十六）陽旦湯（一百十七）白虎加蒼朮湯（一百十八）七味葱白湯（一百十九）增損四順湯（一百二十）化斑湯（一百二十一）官局桔梗湯（一百二十二）麻黃加朮湯（一百二十三）竹皮大圓（一百二十四）古今錄驗橘皮湯（一百二十五）黃連橘皮湯（一百二十六）麥門冬湯

卷之十九 以下計四十一方係正方各方具證治

婦人幷妊婦傷寒藥方

（一）小柴胡湯（二）刺期門穴（三）瀉心三黃湯（四）桂枝紅花湯（五）黃芩芍藥湯（六）柴胡當歸湯（七）乾薑地黃湯（八）燒裩散（九）青竹茹湯（十）當歸白朮湯（十一）加減四物湯（十二）阿膠散（十三）白朮散（十四）葱白散（十五）蘇木湯（十六）黃龍湯（十七）柴胡石膏湯（十八）枳實散（十九）旋復花湯（二十）麥門冬湯（二十一）梔子大青湯（二十二）蘆根湯（二十三）塗臍法（二十四）葱白豉湯（二十五）葱白一物湯（二十六）伏龍肝散（二十七）葛根一物飲（二十八）梔子五物散（二十九）前胡七物湯（三十）升麻六物湯（三十一）陽旦湯（三十二）治痙法（三十三）神功圓（三十四）桂心牡蠣湯（三十五）蜀漆湯（三十六）增損柴胡湯（三十七）竹葉防風湯（三十八）三物黃芩湯（三十九）小柴胡湯（四十）乾薑柴胡湯

(四十一)海蛤散
卷之二十以下計三十三方係正方各方具證治
小兒傷寒
(一)洗心散　(二)惺惺散　(三)四順散　(四)麻黃黃芩湯　(五)升麻黃芩湯　(六)甘露飲子　(七)雙圓　(八)石膏麻桂湯　(九)連翹飲　(十)麥門冬湯　(十一)十物升麻湯　(十二)六物黃芩湯　(十三)五物人參飲　(十四)八物麥門冬飲　(十五)棗葉飲
卷之二十一
小兒瘡疹
(十六)升麻湯　(十七)犀角地黃湯　(十八)麻黃黃芩湯　(十九)升麻黃芩湯　(二十)化毒湯　(二十一)紫草木通湯　(二十二)鼠粘子湯　(二十三)水解散　(二十四)活血散　(二十五)猪尾膏　(二十六)無比散　(二十七)龍腦膏子　(二十八)如聖湯　(二十九)決明散　(三十)撥雲散　(三十一)蜜蒙花散　(三十二)通聖散　(三十三)蛤粉散
卷之二十二
傷寒十勸

活人書釋音
身體類　病證類　藥名類　製鍛類　器用類　拾遺類
活人書辨誤
傷寒藥性
玉石部　草部　木部　人部　獸部　禽部
蟲魚部　菓部　米穀部　菜部　婦人藥性　小兒藥性

類證活人書卷第一

明　新安師古吳勉學校

此一卷論經絡。治傷寒先須識經絡。不識經絡。觸途冥行。不知邪氣之所在。往往病在太陽。反攻少陰。證是厥陰。乃和少陽。寒邪未除。眞氣受斃。又況傷寒看外證爲多。未診先問。最爲有准。孫眞人云。問而知之。別病淺深。名爲巧醫。病家云發熱惡寒。頭項痛。腰脊強。則知病在太陽經也。身熱目疼。鼻乾不得臥。則知病在陽明經也。胸脇痛耳聾口苦舌乾。往來寒熱而嘔。則知病在少陽經也。腹滿咽乾。手足自温。或自利不渴。或腹滿時痛。則知病在太陰經也。引飲惡寒。或口燥舌乾。則知病在少陰經也。煩滿囊縮。則知病在厥陰經也。然後切脈以辯其在表在裏。若虛若實。以汗下之。古人所以云問而知之爲中工。切而知之爲下工。若經隧支絡憒然不分。按寸握尺。妄意疾證。豈知坐授明堂藏室金蘭者耶。

經絡圖

足太陽經
交巔上
上額
起於目內眥
風府穴兩旁各一從此分為四道
下項
循肩膊內
左右四道俠脊
絡腎
膀胱重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合
抵腰中下貫臀
臀樞
腘
腘謂膝後曲脚之中委中穴也
下貫腨內
外踝之後
京骨
至小指外側端

足太陽膀胱經。腎與膀胱爲合。故足少陰與足太陽爲表裏。從目內眥上頭連於風府。分爲四道。下項幷正別脈上下六道以行於背。與身爲經。太陽之經爲諸陽主氣。或中寒邪。必發熱而惡寒。緣頭項腰脊。是太陽經所過處。今頭項痛。身體疼。腰脊強。其脈尺寸俱浮者。故知太陽經受病也。

靈樞經云。足太陽之脈起於目內眥。上額交巔上。其支別者。從巔至耳上角。其直行者。從巔入絡腦。還出別下項。循肩膊內。俠脊抵腰中。入循膂。絡腎屬膀胱。其支別者。從腰中。下會於後陰。下貫臀入膕中。其支別者。從膊內左右別下貫髀。俠脊內。過髀樞。循髀外。從膕下合膕中。下貫踹內。出外踝之後。循京骨。至小指外側端。

足陽明經

大迎穴
在曲頷前一寸一分骨陷中動脈又以口下當兩角者是
頭顱
髮際
頷中
承漿穴在唇下陷者中是
頷車
入上齒縫中
起於鼻
人迎穴
在結喉傍一寸五分動脈應手者是
缺盆穴一名天盆在肩下橫骨陷者中是
胃重二斤十四兩盛穀二斗水一斗五升為水穀之海
絡脾
胃
脾
伏兔穴
在膝上六寸起肉是一云是膝蓋上七寸是
氣衝穴
在歸來下鼠鼷上一寸動脈又云在陰毛兩旁
髀關穴在膝上伏兔後交分中是
膝臏中
中指外間
肘外廉
下膝三寸為正白三里穴而下也三里穴在膝下三寸是
中指內間
大指間出其端
足跗上

足陽明胃之經。脾與胃爲合。故足太陰與足陽明爲表裏。從鼻起夾於鼻。絡於目。下咽分爲四道。幷正別派六道上下行腹綱維於身。蓋諸陽在表。陽明主肌肉。絡於鼻。故病人身熱目疼鼻乾不得臥。其脈尺寸俱長者。知陽明經受病也。

靈樞經云。足陽明之脈。起於鼻交頞中。旁約太陽之脈。下循鼻外。入上齒中。還出挾口。環唇。下交承漿。却循頤後下廉。出大迎。循頰車。上耳前。過客主人。循髮際。至額顱。其支者。從大迎前下人迎。循喉嚨。入缺盆。下膈屬胃絡脾。其直者從缺盆下乳內廉。下挾臍。入氣衝中。其支者。起胃口下循腹裏。下至氣衝中而合。以下髀關。抵伏兔。下膝臏中。下循脛外廉。下足跗。入中指內間。其支者。下廉三寸而別。以下入中指外間。其支者。別跗上。入大指間。出其端。

足少陽經


起於目銳眥
抵頭角
從耳後入耳中
如鼠乳
下頷
合缺盆
下大迎
氣衝穴八分旁動脈應手
在陰毛兩旁動脈應
絡肝
膽
在肝之短葉間重三兩三銖盛精汁三合
毛際
過季脇
下合髀厭
繞毛際
出膝外廉
下輔骨前
抵絕骨
出三毛
出外踝前
出小指次指之端
入大指岐骨內出其端
還貫爪甲

足少陽膽之經。肝與膽爲合。故足厥陰與足少陽爲表裏。起目外眥。絡於耳。遂分爲四道。下缺盆。循於脇幷正別脈六道上下主經營百節流氣三部。故病人胸脇痛而耳聾。黃帝鍼經邪在肝則兩脅痛。又曰膽脈者脅下痛。口中苦。善太息。或口苦咽乾。或往來寒熱而嘔。其脈尺寸俱弦者。知少陽經受病也。

靈樞經云。足經少陽之脈。起於目銳眥。上抵頭角下耳後。循頸。行手少陽之前。至肩上。却交下手少陽之後。入缺盆。其支者。從耳下入耳中。出走耳前。至目銳眥後。其支者。別銳眥。下大迎。合手少陽抵于頗下。如頗車下頸。合缺盆以下胷中。貫膈絡肝屬膽。循脇裏。出氣衝。繞毛際。入髀厭中。其直者。從缺盆下腋。循胷中。過季脇。下合髀厭中。以下循髀陽出膝之廉下。外輔骨之前。直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上。出小指次指之端。其支別者。從跗上。入大指。循岐骨內出其端。

足太陰經



足太陰脾之經．爲三陰之首．其脈布於脾胃．絡於嗌喉．故病人腹滿而嗌乾．尺寸俱沉細者．知太陰經受病也．

脾重二觔三兩．象馬蹄．內包胃脘．象土形也．經絡之氣．交歸於中．以營運眞靈之氣．意之舍也．

靈樞經云．足太陰之脈．起於大指之端．循指內側白肉際．過核骨後．上內踝前廉．上腨（示兗切）內循脛骨後．交出厥陰之前．上循膝股內前廉．入腹屬脾絡胃．上膈．挾咽．連舌本．散舌下．其支者．復從胃別上膈．注心中．

足少陰腎之經。其脈起於小指之下。斜趣足心。別行者。入跟中。上至股內後廉。貫腎絡膀胱。直行者。從腎上貫肝膈。入肺中。繫舌本。傷寒熱氣入於臟。流於少陰之經。少陰主腎。腎惡燥。故渴而引飲。又經發汗吐下已後。臟腑空虛。津液枯竭。腎有餘熱亦渴。故病人口燥舌乾而渴。其脈尺寸俱沉者。知少陰經受病也。

靈樞經云。足少陰之脈起于小指之下。斜趣足心。出于然骨之下。循內踝之後。別入跟中。以上踹（時兗切）內。出膕內廉。上股內後廉。貫脊屬腎絡膀胱。其直者。從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。其支者。從肺出絡心。注胸中。

足厥陰經



足厥陰肝之經。厥者。盡也。靈樞曰。亥爲左足之厥陰。戌爲右足之厥陰。兩陰俱盡。故曰厥陰。夫陰盡爲晦。陰出爲朔。厥陰者。以陰盡爲義也。其脈循陰器而脈絡於舌本也。脈弗營則筋急。筋急則引舌與卵。故唇青舌卷而卵縮。凡病人煩滿而囊縮。其尺寸俱微緩者。知厥陰經受病也。

靈樞經云。足厥陰之脈。起於大指聚毛之際。上循足跗上廉。去內踝一寸。上踝八寸。交出太陰之後。上腘內廉。循股陰。入毛中。環陰器。抵小腹。挾胃屬肝絡膽。上貫膈。布脇肋。循咽喉之後。上入顑顬。連目系。上

出額・與督脉會於巔・其支者・從目系下頰裏・環唇內・其支者・復從肝別貫膈・上注肺中・

（一）問傷寒一二日發熱惡寒頭項痛腰脊強尺寸脈俱浮。此足太陽膀胱經受病也。（仲景云・太陽病欲解時・從巳至未上・）太陽病頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯（正一）輕者只與桂枝麻黃各半湯（正二）麻黃湯桂枝湯二者均爲解散正分陰陽不可不愼也仲景所謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃常須識此勿令誤也今人纔見身熱頭痛便發汗不知汗空閉而用麻黃汗空踈而用桂枝傷寒傷風其治不同古人有汗者當解肌無汗者可發汗。

（二）問傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脈俱長。此足陽明胃經受病也。（仲景云・陽明病欲解時・從申至戌上・）傷寒二日陽明經受病可發其汗非正陽明也（正陽明者・身熱汗出不惡寒・反惡熱・故可下也・）今言二三日傳陽明經身熱目疼鼻乾不得臥其脈俱長者是太陽陽明可表而已若無汗尙惡寒宜升麻湯（雜方）有汗微惡寒者表未解也宜桂枝湯（正方一）無汗脈浮其人喘者與麻黃湯（正二十）○又問十二經皆一而陽明有三何也有太陽陽明有少陽陽明有正陽陽明也太陽陽明者本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也（太陽陽明・脾約是也・大便堅・小便利・其脾爲約・）少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥實大便難也正陽陽明者病人本風盛氣實也三陽明俱宜下唯惡寒及中寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗蓋太陽與陽明合病脈必浮大而長外證必頭疼

腰痛肌熱目痛鼻乾也脈浮大者太陽也長者陽明也頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻乾者陽明也尙惡寒者可升麻湯（雜方一）汗之若不惡寒反惡熱大便不秘者可白虎湯（正方六十四）解利之不惡寒反惡熱大便秘或譫語者屬胃家實也可調胃承氣湯下之（正四十三）○又問三陽有合病有併病何也脈浮大而長頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也三陽皆有合病唯三陰無合病不可不知也太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而讝語者下之愈宜大承氣湯（正四十一）若太陽證不罷不可下宜用桂枝麻黃各半湯（正方二）小發汗設面赤色者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不大徹則陽氣怫鬱不得越散當汗不汗煩躁不知痛處其人短氣但坐蓋以汗出不徹故也更以麻黃湯發其汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知之

（三）問傷寒三四日胸脇痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脈俱弦此足少陽膽經受病也（仲景云少陽病欲解時從寅至辰上）太陽病不解轉入少陽脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尙未可吐下診其脈弦緊者小柴胡湯主之（正方二十九）蓋脈弦細頭疼發熱屬少陽少陽受病口苦咽乾目眩宜小柴胡湯以解表不可發汗（仲景少陽證唯小柴胡爲解表藥耳）發汗則讝語讝語屬胃胃和則愈不和則煩而燥宜調胃承氣湯（正四三）此屬少陽陽明也

（四）問傷寒四五日腹滿咽乾手足自温或自利不渴或腹滿時痛尺寸俱沉細

此足太陰脾經受病也。（仲景云：太陰病欲解時，從亥至丑上。）傷寒手足必微冷。若手足自温者。繫太陰也。自利不渴。屬太陰也。腹滿時痛。屬太陰也。自利不渴者。臟寒也。當温之。宜四逆湯（正方七十五）理中湯也。（正方七十四）腹滿脈浮者。可桂枝（正方一）微發汗。腹痛者。桂枝加芍藥湯（正十二）痛甚者。桂枝加大黃湯。（正十三）〇古人以四日太陰證病在胸膈。可吐而愈。何也。答曰。不然。有太陰證脈大胸滿多痰者。可吐之。脈大而無吐證者。可汗而已。大抵在表者汗之。在裏者下之。在上者湧之。在下者泄之。瓜蒂（正百十一）梔豉（雜十九）隨證施用。不可拘以日數也。

（五）問傷寒五六日。尺寸脈俱沉。或口燥舌乾而渴。或口中和而惡寒。

此足少陰腎經受病也。（仲景云：少陰病欲解時，從子至寅上。）少陰病口燥舌乾者。急下之。宜大承氣湯。（正四十二）若不渴。不口燥舌乾而脈沉者。急温之。宜四逆湯（正方七十五）太陰厥陰皆不惡寒。只有少陰有惡寒之證。不可不知也。少陰病得之一二日。口中和。其背惡寒者。宜着灸并四逆湯也。大抵傷寒陽明證宜下。少陰證宜温。然仲景於少陰證口燥咽乾。即云急下之。蓋少陰主腎。繫舌本。傷寒熱氣入於臟。流於少陰之經。腎汁乾。咽路焦。故口燥咽乾而渴。須宜急下之。非若陽明證宜下而可緩也。雖然。陽明亦有一證。發熱汗出多。急下之。陽明屬胃。汗多則胃汁乾。亦須急下也。

（六）問傷寒六七日。煩滿囊縮。其脈尺寸俱微緩。

此足厥陰肝經受病也。（仲景云：厥陰病欲解時，從丑至卯上。）厥陰病其脈微浮爲欲愈。不浮爲未愈。宜小建中湯。（正三十七）

脈浮緩者。必囊不縮。外證必發熱惡寒。似瘧爲欲愈。宜桂枝麻黃各半湯。（正方二）若尺寸脈俱沉短者。必是囊縮毒氣入臟。宜承氣湯下之。（正方四十二）○大抵傷寒病臟腑傳變。陽經先受病。故次第傳入陰經。以陽主生。故太陽水傳足陽明土。土傳足少陽木。爲微邪也。陰主殺。故木傳足太陰土。土傳足少陰水。水傳足厥陰木。至六七日當傳厥陰肝木。必移氣尅於脾土。脾再受賊邪。則五臟六腑皆困而危殆。榮衞不通。耳聾囊縮。不知人而死矣。速用承氣湯下之。可保五死一生。古人云。脾熱病則五臟危。又云土敗木賊則死。若第六七日傳厥陰。脈得微緩。微浮爲脾胃脈也。故知脾氣全。不再受尅。邪無所容。否極泰來。榮衞將復。水升火降。則寒熱作而大汗解矣。

類證活人書卷第二

此一卷論切脈。治傷寒先須識脈。若不識脈。則表裏不分。虛實不辯。仲景猶誚當時之士。按寸不及尺。握手不及足。必欲診衝陽。按太谿而後歉。況於寸關尺耶。大抵問而知之以觀其外。切而知之以察其內。證之與脈不可偏廢。且如傷寒脈緊。傷風脈緩。熱病脈盛。中暑脈虛。人迎緊盛傷於寒。氣口緊盛傷於食。率以脈別之。非特此也。病人心下緊滿。按之石硬而痛者。結胸也。結胸證於法當下。雖三尺之童皆知。用大黃甘遂陷胸湯下之。然仲景云。結胸脈浮者。不可下。下之則死。以此推之。若只憑外證。便用陷胸湯則誤矣。況傷寒尤要辯表裏。脈浮爲在表。脈沉爲在裏。陽動則有汗。陰動則發熱。得汗而脈靜者生。汗已而脈躁者死。陰病陽脈則不成。陽病陰脈則不永。生死吉凶。如合龜鏡。其微至於禍福休咎。脩短貴賤。無不可考。然古人乃以切脈爲下者。特以脈理精微。其體難辯。而傷寒得外證爲多故也。外證易見。切脈難明。弦緊之混淆。遲緩之參差。沉與伏相類。濡與弱相似。非得之於心。超然領解。孰能校疑似於錙銖者哉。苟知浮芤滑實弦緊洪屬於表。遲緩微濇沉伏濡弱屬於裏。表裏內外。陰陽消息。以經處之。亦過半矣。

脈穴圖

氣口脈帝曰．氣口何以獨爲五藏主．岐伯曰．胃者水穀之海．六府之大源也．五味入口．藏於胃以養五氣．氣口亦太陰也．是以五藏六腑之氣味．皆出於胃．變見於氣口．

人迎脈

左手關前一分。人迎之位。

人迎氣口在頸法象天地要會始終之門戶。

人迎氣口屬太陰肺之經。而黃帝乃云。人迎亦胃脉何也。左手關前一分者人迎之位。挾喉嚨兩旁者人迎之穴。人迎之位屬手太陰肺之經。人迎之穴屬足陽明胃之經。故素問云人迎亦胃脉也。

太谿脈

傷寒何以須診太谿脈耶。答曰。太谿穴是足少陰腎之經。男子以右腎爲命門。女子以左腎爲命門。（三十六難曰命門者神精所舍。原氣所繫。男子藏精。女子繫胞。）主生死之要。病人有命門脈者活。無者死。仲景云少陰病手足逆冷發熱者不死。脈不至者灸太谿七壯。故傷寒必診太谿以察其腎之盛衰也。（太谿二穴。在足內踝後跟骨上動脈陷中。）

傷寒何以須診衝陽脈耶。答曰。衝陽穴是足陽明胃之經。人受氣於穀。穀入於胃。乃傳與五臟六腑。臟腑皆受氣於胃。其清者爲榮。濁者爲衛。榮行脈中。衛行脈外。陰陽相貫。如環無端。胃爲水穀之海。主稟四時。皆以胃氣爲本。是謂四時之變病死生之要會。故傷寒必診衝陽。以察其胃之有無也。衝陽二穴。一名會源。在足跗上五寸骨間動脈上去陷骨三寸。

衝陽脈

風府穴

風池穴



仲景云。太陽病初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯。（正一）愈。謂服桂枝湯後。其證尚自汗發熱惡寒。脈尚寸浮尺弱而反煩。爲邪痺在陽維經。故可先鍼風池（風池二穴。是足少陽陽維之會。在項後髮際陷中。是穴。甲乙經云。風池穴在顖顬後髮際陷者。）風府。（風府一穴。是督脈陽維之會。在項後入髮際一寸。大筋穴中。不可灸。針入四分留三呼。）此二穴陽維之會。非太陽經也。太陽經穴在夾項後髮際大筋外廉陷中名曰天柱。不鍼此者。桂枝已主太陽病故也。

期門穴

期門二穴

期門穴。在乳直下筋骨近腹處是也。凡婦人病。法當鍼期門。不用行子午法。恐纏臟膜引氣上。但下鍼令病人吸五吸。停鍼良久。徐徐出鍼。此是平瀉法也。凡鍼期門。必瀉勿補。可肥人二寸。瘦人寸半深。

關元穴

臍下一寸五分名氣海二寸名丹田三寸名關元關元穴是小腸募足少陰任脈之會鍼入八分留三呼瀉五吸灸亦良然不及鍼氣海穴或作臍下一寸按鍼灸經云臍下一寸曰陰交穴陰交下五分曰氣海

（七）問三部之位

左右手去魚一寸名曰寸口去澤一尺名曰尺部兩境之間名爲關位關位六分陽部出三分陰部入三分關前爲陽關後爲陰爲陰陽之關津寸脈下不至關爲陽絕尺脈上不至關爲陰絕陽得寸內九分取陽奇之數陰得尺內一寸取陰耦之數是名寸關尺也寸上一分爲魚際關下一分爲神門左關爲人迎右關爲氣口三陽從地長故男子尺脈常沉三陰從天生故女子尺脈常浮男子陽多而陰少其脈在關

上故寸盛而尺弱女子陰盛而陽微其脈在關下故寸沉而尺盛所以男子不可以久瀉女子不可以久吐男得女脈爲不足女得男脈爲太過所謂反也（今人以男子尺脈常弱女子尺脈常盛謂之反非也男子陽有餘脈在上尺脈必弱女子陰有餘脈在下寸脈必微乃是正也非反也又以男子以右尺爲命門女子以左尺爲命門謂之反亦非也男子得陰以生先生右腎女子得陽以長先生左腎乃是正也非反也所謂反者只是男子尺脈當弱今反盛女子尺脈應盛今反弱謂之反耳）聖人以察陰陽以決生死雖經絡流注如環無端豈能逃於三部者耶

（八）問診候之法

凡初下指先以中指揣按得關位乃齊下前後二指爲三部脈前指寸口也後指尺部也若人臂長乃踈下指若臂短乃密下指先診寸口（男先左手女先右手）浮按消息之次中按消息之次重按消息之次上竟消息之次下竟消息之次推指外消息之次推指內消息之（醫家責肥人脉浮爲肌肉厚實重取乃得若舉手而得則其浮也甚矣責瘦人脉沉爲皮脉相附而易見若按之始應則其沉也亦甚矣）凡診脈以氣息平定方下指以一呼一吸爲一息其一息之間脈息四至或五至不大不小與所部分四時相應者爲平和脈也過則爲至不及則爲損損至之脈難經言之詳矣（所屬部分謂心位洪肺位浮腎位沉肝位弦脾位緩也四時謂春脉弦夏脉洪四季脉緩秋脉浮冬脉沉也假令心脉本位雖當見洪得冬脉須微帶沉下是四時相應餘皆倣此）

（九）問脈息之證

脈之字从肉從辰又作䐃蓋脈以肉爲陽䐃以血爲陰華佗云脈者氣血之先也氣血盛則脈盛氣血衰則脈衰氣血熱則脈數氣血寒則脈遲氣血微則脈弱氣血平則脈緩又長人脈長短人脈短性急則脈急性緩則脈緩反此者逆按內經云形盛脈細氣少不足以息者危形瘦脈大胸中氣多者死形氣相得

者生。參伍不調者病。難經云。數者腑也。遲者臟也。數則爲熱。遲則爲寒。諸陽爲熱。諸陰爲寒。王叔和云。脈沉爲在裏。脈浮爲在表。遲則在臟。數則在腑。滑爲實爲下。數爲虛爲熱。張仲景云。脈大浮數動滑。此名陽也。脈沉濇弱弦微。此名陰也。陰病見陽脈者生。陽病見陰脈者死。大抵陽脈常浮而速。陰脈常沉而遲。七表屬腑。病在於陽。春夏見之易治。八裏屬臟。病在於陰。秋冬見之猶輕。假令數在左寸。浮之得者熱入小腸。沉之得者熱入於心。餘皆倣此。脈理精微。非言可盡。論其梗概。不出於此矣。王叔和云。在心易了。指下難明。亦在乎人熟之而已矣。

（十）問七表

七表。陽也。陽數奇。浮。按之不足。舉之有餘。寸口浮。其人傷風。發熱頭疼。關上浮。腹滿。尺中浮小便難。趺陽浮即爲虛。扎。浮大而軟。按之中央空。兩邊實。扎主失血。寸口扎主吐血。微扎者衄。關上扎。大便血。尺中扎。小便血。滑。往來前却流利。替替然與數相似。脉滑爲陽。滑爲噫逆。寸口滑爲陽盛。關上滑爲陽。尺中滑小便赤。婦人經候不利。然而尺脉滑者。亦本形也。趺陽脉滑者。胃氣實。實。脈大而長。按之隱指。愊愊然。浮沉皆得。寸口實。主上焦熱。關上見之腹脹。尺中有此。主小腹痛。并小便澁。弦。舉之無有。按之如弓弦狀。又曰浮緊乃爲弦。狀如弓弦。按之不移。陽弦則頭痛。陰弦則腹痛。大抵傷寒脉須弦。蓋人迎緊盛傷於寒。人迎者少陽之分。少陽脉主弦。故也。寒邪中人。其脉必弦。弦則多兼洪數。爲其先有邪熱也。洪數甚者。正爲陽證。若沉細而弦疾。乃正陰證也。緊。按之實。數似切繩狀。緊則爲寒。寸口緊頭痛。關緊心中滿痛。尺緊臍下痛。陰陽俱緊。當清邪中於上。濁邪中於下。洪。極大在指下。舉按滿指。寸口洪。主胸膈煩熱。關洪。主胃熱口乾。尺中洪。主大小便血。三部洪。三焦俱熱。

（十一）問八裏

八裏。陰也。陰數耦。微。若有若無。極細而軟。微則爲虛。寸口微爲陽不足。陽微則惡寒。陰微則下利。沉。舉之不足。按之有餘。沉爲在裏。尺寸俱沉者少陰

受病也．然沉而遲者．乃陰證也．宜溫之．沉而數者有熱也．宜下之．宜緩去來亦遲．小駛於遲．緩則爲虛．太陽病．其脉緩者爲傷風．惟脾得之卽是本形．濇細而遲往來難時一止．濇則少血．寸口澁少氣．上焦冷．關上澁胃冷脾痛．尺中澁小便數．小腹冷．三部俱澁．腹中氣結．王冰曰．陽有餘則血少．故脉濇也．又曰．濇者陽氣有餘．陽氣有餘爲身熱無汗．遲呼吸三至去來極遲．遲則爲寒．寸口遲則上焦冷．關上遲胃冷不欲食．吞酸吐水．尺中遲．小便多．并白濁．伏極重按之指著骨乃得．伏主物聚．寸口伏胸中逆氣．關上伏有水氣．濇泄．尺中伏．水穀不化．大抵關前得之多爲熱．關後得之多爲冷．關中得之陰陽結．或冷或熱不定．當以餘證參之．濡按之似無舉之全無力．形與緩濇遲於雖稍殊．其爲冷證皆一也．弱極軟而沉細按之欲絕指下．弱爲虛．寸口弱．陽氣虛．汗自出．關弱無胃氣．胃中有熱．脉弱爲虛熱病作．不可大攻．熱去寒起．尺中弱．氣少發熱也．

（十二）問脈按之來緩時一止復來又脈來動而中止不能自還因而復動有結脈有促脈有代脈結者陰也．陰盛則結．脈來緩時一止復來曰結．主胸滿煩躁．促者陽也．陽盛則促．脈來數時一止復來曰促．主積聚氣痞憂思所成．太陽病．下之後．脉促胸滿者．桂枝去芍藥湯主之．（正方七）若微寒桂枝去芍藥加附子湯主之．（正八）太陽病桂枝證醫反下之．利遂不止．脉促者．表未解也．喘而汗出者．葛根黃芩黃連湯主之（正二十八）．大抵結促之脈雖時一止爲病脈．非死脈也．惟代脈者．眞死矣．往來緩動而中止．不能自還．因而復動．名曰代也．代者死也．仲景傷寒脈結代心動悸．炙甘草湯主之．（正五十六）

類證活人書卷第三

此一卷論表裏。治傷寒須辯表裏。表裏不分。汗下差誤。古人所以云桂枝下咽。陽盛卽斃。承氣入胃。陰盛以亡。傷寒有表證。有裏證。有半在表半在裏。有表裏兩證俱見。有無表裏證。在表宜汗。在裏宜下。半在裏半在表宜和解。表裏俱見。隨證滲泄。無表裏證。用大柴胡湯下之。(正方三十)又四逆湯(正七十五)證。有先温裏乃發表。桂枝湯(正方一)證。有先解表乃攻裏。仲景云。下利清穀。身體疼痛。急當救裏。身體疼痛。清便自調。急當救表。如響應桴。間不容髮。非特此也。均是發熱。身熱不渴爲表有熱。小柴胡加桂主之。(正二十九)厥而脈滑爲裏有熱。白虎加人參主之。(正六十五)黃帝所謂發表不遠熱。攻裏不遠寒也。均是水氣乾嘔。微利發熱而欬爲表有水。小青龍加薑花主之。(正三十六)身體涼。表證罷。欬而脅下痛爲裏有水。十棗湯主之。(正八十九)均是惡寒發熱。而惡寒者發於陽也。麻黃桂枝小柴胡主之。無麻黃桂枝小柴胡湯。只有柴胡桂枝湯。(見正方三十一)無熱而惡寒者發於陰也。附子四逆湯主之。(正七十五)均是身體痛。脈浮發熱。頭疼身體痛者爲表未解。麻黃湯主之。(正二十)脈沉自利身體痛者爲裏不和。四逆湯主之。(正七十五)以此觀之。仲景之於表裏亦詳矣。學者宜深究之。雖然。傷寒六七日目中不了了。無表裏證。脈雖浮亦有下之者。少陰病二三日無陽證。亦有發汗者。非表裏之所能拘。又不可不知也。

(十三) 問表證

發熱惡寒身體痛而脈浮者表證也（浮表陽也其脈按之不足舉之有餘素問云寸口脈浮而盛曰病在外寸口脈沉而緊曰病在中仲景云脈浮者病在表可發汗又曰表有病者脉當浮又曰結胸證脉浮者不可下則知脉浮者表證也）表證者惡寒是也惡寒者表之虛此屬太陽宜汗之然傷寒發表須當隨病輕重而汗之故仲景有發汗者有和解之者兼四時發汗亦自不同○春不可大發汗以陽氣尚弱不可亟奪使陰氣勝于時天寒初解榮衛腠理緩可用小柴胡湯（正二十九）之類○冬不可汗者以陽氣伏藏不可妄擾不問傷寒中風以輕藥解利之傷寒無汗者只與桂枝麻黃各半湯（正方二）傷風有汗只與柴胡桂枝湯（正三十一）或得少汗而解或無汗自解（病勢甚者不拘此）○夏月天氣大熱玄府開脈洪大宜正發汗但不可用麻黃桂枝熱性藥須是桂枝麻黃湯加黃芩石膏知母升麻也（加減法在第十二卷藥方中）夏月有桂枝麻黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣便發黃斑出也白虎湯雖可用然治中暑與汗後一解表藥耳一白虎未能驅逐表邪況夏月陰氣在內或患熱病而氣虛人妄投白虎往往有成結胸者以白虎性寒非治傷寒藥也○凡發汗欲令手足俱周濈濈然一時許爲佳不欲如水淋漓服湯中病卽止不必盡劑然發汗須如常覆腰以上厚衣覆腰以下蓋腰以上流漓而腰以下至足心微潤病終不解凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之令腰脚周遍爲度○又問三陰有可汗者乎陰病不當發汗發汗卽動經然太陰脈浮少陰發熱亦須微微取汗但不正發汗耳大抵風寒中人與榮衛俱薄而發熱又未曾行諸汗藥雖無陽證須少汗解逐之王叔和云表中風寒入裏則不消故知初病脈沉細數雖裏不消本表中風寒須宜溫覆少汗而解仲景太陰證脈浮可汗宜桂枝湯（正方一）少陰病發熱脈沉宜麻黃細辛附子湯（正二十三）少

陰二三日。常見少陰證。無陽證者。宜麻黃附子甘草湯（正二十二）微發汗。皆陰證表藥也。要知脈沉細數。病在裏不可發汗。此大略之言耳。脈應裏而發熱在表。宜以小辛之藥取微汗而温散也。○大抵傷寒太陽證發熱惡寒。宜發其汗。然熱多寒少。其脈微弱。或尺脈遲者。不可表也。太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯。（正方四）尺脉遲者。血少也。先以小建中加黃耆湯。（正方三十七）以養其血。晬時用小柴胡桂枝二越婢一湯。小分劑以和解之。其人當汗而衄。血下血者。不可表也。太陽病脉浮而緊。發熱身無汗。自衄者愈。不可汗。汗出必額上陷。脉緊急。直視。不得瞬。又云。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。不愈宜桂枝湯。（正方一）壞病者。不可表也。太陽病三日。已發汗。若吐若下若温針。仍不解者。爲壞病。桂枝不中與也。當犯何逆。隨證治之。又云太陽病不解。傳入少陽者。脅下鞕滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尚未吐下。脉沉緊者。與小柴胡湯。（正二十九）若已吐下發汗。柴胡證罷。此爲壞病。知犯何逆。以法治之。婦人經水適來者。不可表也。婦人病經水適下而發其汗。則鬱冒不知人。此病爲表裏俱虛。故令鬱冒也。風温者。不可表也。脉尺寸俱浮。頭疼身熱。常自汗出。體重。其息必喘。其形不仁。嘿嘿但欲眠者。風温證也。復發其汗者死。宜麥門冬湯。（雜四十五）濕温者。不可表也。證也。兩脛逆冷。胸腹滿。頭目痛苦妄言。不可發汗。發汗者。必多汗者。濕温也。復發其汗者死。宜麥門冬湯。（雜四十五）濕温者。不可表也。證也。兩脛逆冷。胸腹滿。頭目痛苦妄言。不可發汗。發汗者。名曰重暍

下之。○傷寒始發熱惡寒。今汗後不惡寒。但倍發熱而躁。始脈浮大。今脈洪實。或沉細數。始惺靜。今狂語。此爲胃實陽盛。再汗卽死。須下之卽愈。○亦有始得病。便變陽盛之證。須便下之。不可拘以日數。○更有心胸連臍腹大段痞悶。腹中疼。坐臥不安。冒悶喘急極者。亦不候他證。便下之。凡大便祕。妨悶恐尙有表證者。亦須少小飲小承氣湯（正四十二）微解之。不可過多。令大泄也。失下則氣血不通。四肢便厥。醫人不知。反疑是陰厥。復進熱藥。禍如反掌。不可不察也。○又問三陰有可下者乎。三陰大約可温。然須有積證方可也。何謂積證。太陰腹滿時痛。桂枝加芍藥湯（正十二）痛甚者桂枝加大黃湯（正十三）少陰口燥咽乾。或腹滿不大便。或下利清水。心下痛。皆積證也。仲景云。少陰病得之二三日口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯。（正四十一）少陰病自利清水。心下痛。口乾者。宜大承氣湯也。下證悉具。服湯已。更衣者。止後服不爾。盡劑服之。更衣謂病人服承氣湯後得下利。故勿與也。下後愼不中服補藥。孫眞人云。服大承氣湯得利差。愼不中服補藥也。熱氣得補復成。更復下之。是重困也。宜消息安養之。○大抵傷寒最愼於下。若表證未罷。不可亂投湯劑。虛其胃氣。仲景云。表解而內不消。非大滿。猶生寒熱。則病不除也。表已解而內不消。大滿大實。堅有燥屎。乃可下之。雖四五日不能爲禍。若不宜下而便攻之。仲景云。脈浮者。病在表。可發其汗。脈虛細者。不可下。王叔和云。脈微不可下。而便攻之。內虛熱入。協熱遂利。煩躁諸變。不可勝數。韓者困篤。重者必死矣。古人所以傷寒有承氣之戒。脈浮者不可下。應汗而下。爲懊憹。爲痞。爲結胸。惡寒者不可下。惡寒者。表之虛。雖是陽明證。尙惡寒。卽與太陽合病。屬表。可發其汗。少陰惡寒。當温之。嘔吐者不可下。仲景云。嘔多雖有陽明證。不可下。陽明病脅下硬滿。不大便而嘔。舌上白胎者。宜與小柴胡湯。（正二十九）上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然汗出。得屎而解。不轉失氣者不可下。轉失氣。今人所謂下泄也。傷寒論云。陽明病不大便。六七日恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。腹中轉失氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失氣者。此但頭硬後必溏。不可攻之。攻之必脹滿不能食也。又云。陽明病讝語。發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。（正四十二）因與小承氣湯一升。腹中轉失氣者。更服一升。若不轉失氣者。勿更與之。仲景無治法。今詳。宜與小柴胡湯。（正二十九）明日又不大便。脈反微濇者。裏虛也。爲難治。仲景亦無治法。宜與黃耆建中湯。大便堅小便數不可用承氣湯攻之。胃氣強。濇則小便

數．浮濇相搏．大便則硬．其脾爲約．麻子人丸主之．（正九十二）千金云．脾約者．大便堅．小便利．宜枳實丸．太陽陽明者．脾約乃是也．小便清者不可下．仲景云．傷寒不大便．六七日頭疼有熱．與承氣湯．小便清者．知不在裏．大便硬．小便少者．未可攻．恐津液還入胃．必先轉後溏也．小便自如．乃可攻之．當問其小便日幾行．若本小便日二四行．今日再行．故知大便不久出．今爲小便數少．以津液當還入胃中．故知不久必大便也．陽明病自汗出．若發汗．小便自利者．不可下．此爲津液內竭．雖硬不可攻之．當須自大便蜜導之．若土瓜根、大猪膽汁．皆可導之．（正一百十一）以此知古人愼用轉藥如此．

（十五）問表裏兩證俱見

傷寒表證當汗．裏證當下．不易之法也．發表攻裏．本自不同．甘遂神丹不可以合飲．桂枝承氣安可以並進．○然而假令病人脈浮而大．是表證當汗．其人發熱煩渴．小便赤．却當下．此是表裏證俱見．五苓散主之．（正六十六）仲景云．中風發熱．六七日不解而煩．有表裏證．渴欲飲水者．水入則吐．名曰水逆．五苓散主之．○假令傷寒不大便六七日．頭痛有熱者．是裏證當下．其人小便清者．知不在裏．仍在表．當須發汗．此是兩證俱見．即未可下．宜與桂枝湯．（正方一）○假令病人心下滿．口不欲食．大便硬．脈沉細．是裏證當下．其人頭汗出．微惡寒．手足冷．却當汗．此兩證俱見者．仲景所謂半在裏半在表也．小柴胡湯主之．（正二十九）○假令太陽病表證未除．而醫數下之．遂協熱而利．利不止．心下痞硬．仲景謂之表裏不解．桂枝人參湯主之．（正十六）○本太陽病．醫反下之．因爾腹痛．是有表復有裏．仲景用桂枝加芍藥湯．（正十二）痛甚者．桂枝加大黃湯．（正十三）此皆仲景治傷寒有表復有裏之法．學者當以意推之也．

（十六）問無表裏證

傷寒四五日後以至過經。（十三日爲過經。加減法在第十二卷藥方中也。）無表證。又於裏證未可下者。但非汗證。亦非下證者。皆可用小柴胡。（正二十九）隨證加減用之。以至十餘日者。亦可用。十餘日外用小柴胡湯不愈者。若大便硬。看證可下。則用大柴胡下之。（正三十）以過經。其人氣稍虛當下者。用大柴胡湯則穩。蓋恐承氣湯太緊。病人不禁也。○仲景云。六七日目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱。此爲實也。當下之。宜大承氣湯。（正四十一）○又云。病人無表裏證。發熱七八日。脈雖浮數。可大柴胡下之。（正三十）假令已下。脈數不解。至六七日不大便者。有瘀血也。屬抵當湯。（正九十一）

（十七）　問病人有身大熱。反欲得衣。有身大寒。反不欲近衣者。

此名表熱裏寒。表寒裏熱也。病人身大熱。反欲得衣。熱在皮膚。寒在骨髓也。仲景無治法。宜先與陰旦湯。（雜方六）寒已。次以小柴胡加桂。（雜卅九）以温其表。病人身大寒。反不欲近衣。寒在皮膚。熱在骨髓也。仲景亦無治法。宜先與白虎加人參湯。（正六十五）熱除。次以桂枝麻黃各半湯。（正方二）以解其外。大抵病有標本。治有先後。表熱裏寒者。脈須沉而遲。手或微厥。下利清穀也。所以陰證亦有發熱者。四逆湯、（正七十五）通脈四逆湯主之。（正八十一）表寒裏熱者。脈必滑而厥。口燥舌乾也。所以少陰惡寒而踡。時時自煩。不欲厚衣。用大柴胡下之。（正三十）而愈。此皆仲景之餘議也。

類證活人書卷第四

此一卷論陰陽治傷寒須識陰陽二證手足各有三陰三陽合爲十二經在手背者爲陽屬表爲腑在手掌裏者爲陰屬裏爲臟足經倣此傷寒只傳足經不傳手經素問熱論亦只說足三陰三陽受病巢氏言一曰太陽屬小腸誤矣足之陽者陰中之少陽足之陰者陰中之太陰足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹陽務於上陰務於下陽行也速陰行也緩陽之體輕陰之體重陰家脈重陽家脈輕陽候多語陰證無聲陽病則旦靜陰病則夜寧陽虛則暮亂陰虛則夜爭陰陽消息證狀各異然而物極則反寒暑之變重陽必陰重陰必陽陰證似陽陽證似陰陰盛隔陽似是而非若同而異明當消息以法治之

（十八）問陰證

太陰少陰厥陰皆屬陰證也太陰者脾也少陰者腎也厥陰者肝也○何謂太陰證太陰脾之經主胸膈膜脹甲乙經云邪生於陽者得之風雨寒暑邪中於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又曰賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入腑陰受之則入臟入六腑則身熱不時上爲喘呼入五臟則膜滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼○何謂少陰證少陰腎之經主脈微細心煩但欲寐或自利而渴又問經云一二日少陰病者何也謂初中病時腠理寒便入陰經不經三陽也傷寒雖是三陰三陽大抵發於陽則太陽也發於陰則少陰也此

二經爲表裏．其受病最爲多．陽明太陰受病頗稀．至於少陽厥陰肝膽之經．又加少焉．凡病一日至十二三日．太陽證不罷者．但治太陽．有元得病便見．（去聲）少陰證者．直攻少陰．亦不必先自太陽次傳而至．蓋寒氣入太陽卽發熱而惡寒．入少陰經．只惡寒而不發熱也．三陰中寒．微則理中湯（正七十四）稍厥或中寒下利．卽乾薑甘草湯．（正五十五）手足指頭微寒冷謂之清．（音去聲）此未消喫四逆．蓋疾輕故也．只可服理中乾姜之類．大段重者．用四逆湯（正七十五）無脈者用通脈四逆湯也．（正八一）○何謂厥陰證．厥陰肝之經主消渴．氣上衝心中疼熱．饑不欲食．食則吐蚘．下之利不止也．若陰氣獨盛．陽氣暴絕．則爲陰毒．其證四肢逆冷．臍腹築痛．身如被杖．脈沉疾．或吐或利．當急灸臍下．服以辛熱之藥．令陽氣復而大汗解矣．古人云．辛甘發散爲陽．謂桂枝甘草乾薑附子之類．能復其陽氣也．微用辛甘．甚則用辛苦．陰極發躁．陰證似陽．學者當以脈別之．

（十九）　問陽證

太陽陽明少陽．皆屬陽證也．太陽者．膀胱也．發熱惡寒．頭疼腰痛而脈浮也．陽明者．胃也．不惡寒反惡熱．濈濈汗出．大便祕．潮熱而脈長也．少陽者．膽也．口苦咽乾．脅下滿．發熱而嘔．或往來寒熱而脈弦也．麻黃湯（正二十）大青龍湯（正三十五）桂枝湯．治太陽經傷風寒也．大柴胡湯（正三十）調胃承氣湯（正四十三）小承氣湯（正四十二）大承氣湯（正四一）治陽明傷寒也．小柴胡湯（正二十九）治少陽傷寒也．其他藥皆發汗吐下後證也．○若陽氣獨盛．陰氣暴絕．卽爲陽毒．必發躁狂走妄言．面赤咽痛．身斑斑如錦紋．或下利赤黃．脈洪實．或滑促．當以酸苦之藥．令陰氣復而大汗解矣．古人云．酸苦湧泄爲陰．謂苦參大青葶藶苦酒之類．（雜十六）能復其陰氣也．微用苦．甚則兼用酸苦．折熱復陰．若熱極發厥．陽證似陰．學者當以脈別之．

（二十）問手足逆冷。臍腹築痛。咽喉疼。嘔吐下利。身體如被杖。或冷汗。煩渴。脈細欲絕。此名陰毒也。陰毒之爲病。初得病手足冷。背強咽痛。糜粥不下。毒氣攻心。心腹痛。短氣。四肢厥逆。嘔吐下利。體如被杖。宜服陰毒甘草湯（雜七）白朮散（雜八）附子散（雜九）正陽散（雜十）肉桂散（雜十一）回陽丹（雜十二）返陰丹（雜十三）天雄散。正元散。退陰散（並雜十四）之類。可選用之。○大抵陰毒本因腎氣虛寒。或因冷物傷脾。外傷風寒。內既伏陰。外又感寒。或先感外寒而內伏陰。內外皆陰。則陽氣不守。遂發頭疼腰重。腹痛眼睛疼。身體倦怠。四肢逆冷。額上手背冷汗不止。或多煩渴。精神恍惚。如有所失。三二日間。或可起行。不甚覺重。診之則六脈俱沉細而疾。尺部短小。寸口脈或大。（六脈俱浮大。或沉取之大而不甚疾者。非陰證也。大抵陽毒傷寒。其脈多弦而洪數。陰毒傷寒。其脈沉細而弦疾。不可不知也。）若誤服涼藥。則渴轉甚。躁轉急。有此病證者。便須急服辛熱之藥。一日或二日便安。○若陰毒漸深。其候沉重。四肢逆冷。腹痛轉甚。或咽喉不利。心下脹滿結硬。躁渴。虛汗不止。（陽盛則身汗。陰盛則身冷而有汗。岐伯云。陽勝則身熱。腠理閉。喘麤。爲之俛仰。汗不出而熱。陰勝則身寒汗出。身常清。數慄而寒。寒則厥。）或時鄭聲。指甲面色青黑。六脈沉細而疾。一息七至已來。有此證者。速於氣海或關元二穴灸三二百壯。以手足和煖爲効。仍兼服正陽散。肉桂散。回陽丹。返陰丹。天雄散。白朮散。內外通逐。令陽氣復而大汗解矣。（陰獨盛而陽氣暴絕。則爲陰毒。若陽獨盛而陰氣暴絕。則爲陽毒。大凡陰陽離絕。非大汗不能復其正氣也。）○若陰毒已深。疾勢困重。六脈附骨。取之方有。按之即無。一息八至已上。或不可數至。此則藥餌難爲攻矣。但於臍中用葱熨法（雜十五）或灼艾三五百以來。手足不温者。不可治也。如得手足温。更服前熱藥以助之。若陰氣散。陽氣來。即漸減熱藥而調治之。（陽氣乍復。往往卻煩躁。愼不可投涼藥。煩躁甚者。再與返陰丹即定。常須識此。勿令誤也。）

（二十一）問發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃而脈洪實此名陽毒也傷寒病若陽氣獨盛陰氣暴絕必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃脈洪實或滑促宜用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣（雜十六）陽毒升麻湯（雜十七）大黃散（雜十八）梔子仁湯（雜十九）黑奴圓（雜二十）可選而用之○近人治傷寒脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如煙煤則宜以水漬布薄之疊布數重新水漬之稍損去水搭於胸上須臾蒸熱又漬令冷如前薄之仍數換新水日數十易熱甚者置病人於水中熱勢纔退則已亦良法也

（二十二）問病人潮熱獨語如見鬼狀發則不識人尋衣撮空直視微喘仲景云傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視但發熱讝語者大承氣湯主之（正四一）若一服利則止後服脈弦者生濇者死（弦者陽也濇者陰也陽證見陰脈者死病人有陽證而脈濇者慎不可下）

（二十三）問胸膈不快膜滿閉塞脣青手足冷脈沉細少情緒或腹痛此名太陰也近人多不識陰證纔見胸膈不快便投食藥非其治也大抵陰證者由冷物傷脾胃陰經受之也主胸膈膜滿面色及脣皆無色澤手足冷脈沉細少情緒亦不因嗜慾但內傷冷物或損動胃氣遂成陰證復投巴豆之類胸膈愈不快或吐而利經一二日遂致不救蓋不知寒中太陰也太陰者脾之經也○又問萬一飲食不節胸膈不快寒中陰經何法以治之答云急作理中湯加青橘陳橘剉如麻豆大

服一二劑。胸膈即快。枳實理中圓（雜八一）五積散（雜二十一）尤良。

（二十四）　問脈微細。欲吐不吐。心煩。但欲寐。五六日自利而渴。此名少陰也。少陰之爲病。欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。虛故引水自救。若小便色白者。少陰病形悉具。小便白者。以下焦虛有寒。不能制水。故令色白也。四逆湯主之。（正七五）○少陰病。若口燥舌乾而渴者。須急下之。不可緩也。大承氣湯主之。（正四一）若脈沉而遲者。須温之。四逆湯主之。蓋以口燥而渴者。知其熱。脈沉而遲者。別其寒也。（少陰屬腎。古人謂之腎傷寒也。腎傷寒。口燥舌乾而渴。固當急下。大抵腎傷寒。亦多表裏無熱。但苦煩憒。默默而極。不欲見光明。有時腹痛。其脈沉細。舊用四順湯。古人恨其熱不堪用云。腎病而證猶有熱者。可服仲景四逆散。（正七六）若已十餘日。下利不止。手足徹冷。乃無熱候。可增損四順湯。（雜百十九）○少陰病若惡寒而蜷時時自煩。不欲厚衣者。用去大黄大柴胡湯。（正三十）○少陰病始得之。反發熱。脈沉者。麻黄細辛附子湯（正二十三）微汗之。○少陰病得之二三日。常見少陰無陽證者。亦須微發汗。宜麻黄附子甘草湯。（正二十二）此學者不可不知也。

（二十五）　問身微熱煩躁。面赤脈沉而微。此名陰證似陽也。陰發躁熱發厥。物極則反也。大率以脈爲主。諸數爲熱。諸遲爲寒。無如此最驗也。假令身體微熱。煩躁面赤。其脈沉而微者。皆陰證也。身微熱者。裏寒故也。煩躁者。陰盛故也。面戴陽者。下虛故也。若醫者不看脈。以虛陽上膈躁。誤以爲實熱。反與涼藥。則氣消成大病矣。外臺秘要云。陰盛發躁。名曰陰躁。欲坐井中。宜以熱藥治之。仲景少陰證面赤者。四逆加葱白主之。

（二十六）問手足逆冷而大便祕小便赤或大便黑色脈沉而滑。此名陽證似陰也。重陽必陰。重陰必陽。寒暑之變也。假令手足逆冷而大便祕小便赤或大便黑色。其脈沉而滑者。皆陽證也。輕者白虎湯（正六四）甚者承氣湯（正四二）傷寒失下。血氣不通。令四肢逆冷。此是伏熱深。故厥亦深。速用大承氣（正四一）加分劑下之。汗出立差。（仲景所謂厥應下之者此也。）○兼熱厥與陰厥自不同。熱厥者微厥即發熱。若陰厥即不發熱。四肢逆冷。惡寒脈沉而細。大小便滑泄矣。

（二十七）問身冷脈細沉疾煩躁而不飲水。此名陰盛隔陽也。傷寒陰盛隔陽者。病人身冷。脈細沉疾煩躁而不飲水者是也。若欲引飲者非也。不欲飲水者。宜服霹靂散（雜二十二）須臾躁止。得睡汗出即差。此藥通散寒氣。然後熱氣上行。汗出乃愈。火焰散（雜二十二）丹砂丸（雜二十四）並主之。

（二十八）問手足逆冷。此名厥也。厥者。逆也。陰陽不相順接。手足逆冷也。陽氣衰。陰氣盛。陰勝於陽。故陽脈爲之逆。不通於手足。所以逆冷也。傷寒熱多厥少者。其病當愈。厥多熱少者。其病爲進。○然有冷厥有熱厥。當子細辯認。○冷厥者。初得病日便四肢逆冷。脈沉微而不數。足多攣臥而惡寒。或自引衣覆蓋。不飲水。或下利清穀。或清便自調（清便自調。即是大便如常。）或小便數。外證多惶惶而靜。脈雖沉實。按之遲而弱者。知其冷厥也。（四逆湯正七五　理中湯正七四　通脈四逆湯正八一　當歸四逆湯正七九　當歸四逆加茱萸生薑湯正八十　白通加豬膽湯正九八）皆可選用也。○熱厥者。初中病。必身熱頭痛。外別有陽證。至

二三日乃至四五日。方發厥。兼熱厥者。厥至半日卻身熱。蓋熱氣深。則方能發厥。須在二三日後也。若微厥。卽發熱者。熱微故也。其脈雖沉伏。按之而滑。爲裏有熱。其人或畏熱。或飲水。或揚手擲足。煩躁不得眠。大便祕。小便赤。外證多昏憒者。知其熱厥也。白虎湯。（正六四）承氣湯。（正四二）隨證用之。仲景云。傷寒一二日至四五日厥者。必發熱。前熱者後必厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。厥應下之而反發汗者。必口傷爛赤。熱厥當下。故云厥應下之者。若反發汗。必口傷爛赤也。又有下證悉具而見四逆者。是失下後。血氣不通。四肢便厥。醫人不識。卻疑是陰厥。復進熱藥。禍如反掌。大抵熱厥須脈沉伏而滑。頭上有汗。其手雖冷。時復指爪溫。須便用承氣湯下之。不可拘忌也。諸手足逆冷。皆屬厥陰。不可下。不可汗。然有須下、有須汗證者。謂手足雖逆冷。時有溫時。手足掌心必煖。非正厥逆也。當消息之。○若病人寒熱而厥。面色不澤。冒昧而兩手忽無脈。或一手無脈者。必是有正汗也。多用綿衣包手足。令溫暖。急服五味子湯。（雜二十五）或兼與麻黃細辛甘草湯之類。服之晬時。必大汗而解矣。○或傷寒厥逆而心下怔忡者。宜先治水。當服茯苓甘草湯。（正五三）卻治厥。不爾。水漬入胃。必下利也。○又有病人手足厥冷。脈乍結者。邪氣結在胸也。心下滿而煩。饑不能食者。病在胸中。當吐之。宜瓜蒂散。（正百十一）蓋病在胸中。亦能令人手足厥。但認脈乍結者是也。陰虛則結。脈來緩時一止復來曰結。主胸滿煩躁。○若傷寒發厥至七八日。膚冷而躁。無時暫安者。爲臟厥。此爲難治。○又問仲景少陰四逆湯。又有四逆散。何也。答曰。大抵少陰病不可便用熱藥。且如少陰病。亦有表熱者。仲景謂之晚發熱。用麻黃細辛之類以發汗。終不成少陰證。便不得發汗耶。今少陰病四肢冷。亦有內熱者。仲景用四逆散。（正七六）是也。四逆湯用附子乾薑。而四逆散主四逆。而其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。

或泄利下重。已上病皆熱證耳。

（二十九）問吐長蟲

此名蚘厥也。蚘厥者。臟寒蚘上入膈。其人吐蚘也。此是厥陰證。或病人有寒。復發其汗。胃中冷。及因發汗後身熱。重發其汗。胃中虛冷。故長蟲逆上。先服理中圓。（正七四）次用烏梅圓。（正百六）

（三十）問身體重少氣。陰腫入裏。腹內絞痛。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。婦人則裏急。腰膀連腹內痛。

此名陰陽易也。傷寒病新差。陰陽氣未和。因合房室。則令人陰腫入腹絞痛。婦人則裏急。腰膀連腹內痛。名爲陰陽易也。其男子病新差未平復。而婦人與之交接得病。名曰陽易。其婦人病新差未平復。男子與之交接得病。名曰陰易。所以呼爲易者。陰陽相感動。其毒疫著於人。如換易然。其病狀身體重。熱上衝胸。頭重不能舉。眼中生花。四肢拘急。小腹絞痛。手足拳。則皆死。其亦有不即死者。病苦小腹裏急。熱上衝胸。頭重不欲舉。百節解離。經脈緩弱。血氣虛。骨髓枯竭。便恍恍翕翕。氣力轉小。著牀而不能搖動。起止仰人。或引歲月方死。燒褌散、（正百十三）猳音加・鼠糞湯、（雜二十六）竹皮湯、乾薑湯、青竹茹湯、當歸白朮湯、（並雜二十七）可選用之。

類證活人書卷第五

此一卷論治法。古人治傷寒有法。非雜病之比。五種不同。六經各異。陰陽傳受。日數淺深。藥劑温涼。用有先後。差之毫釐。輕者危殆。況不識法者乎。傷寒唯兩感不治。其餘證候雖咸異氣。能消息之。無不愈者。其有差失。仲景所謂醫殺之耳。知其法者。若網在綱。如此而汗。如此而吐。如此而下。桂枝承氣。瓜蒂四逆。用之無不差。唯其應汗而下。爲痞爲結胸。爲懊憹。應下而汗。爲亡陽。爲讝語。爲下厥上竭。又有當温反吐。療熱以温。變證百出。無復紀律。擾擾萬緒起矣。大抵傷於寒爲病熱。孫眞人云。服承氣湯得利差。愼不中補也。熱氣得補復成。王叔和云。虛熱不可大攻之。熱去則寒起。二人之論。疑若相戾。然熱氣有實有虛。非深得仲景之意。豈能至此耶。

（三十一）問冬謂之傷寒。春謂之温病。夏謂之熱病。

素問云。冬三月。是謂閉藏。水冰地坼。無擾乎陽。又云。彼春之暖。爲夏之暑。彼秋之忿。爲冬之怒。是以嚴寒冬令。爲殺厲之氣。君子善攝生。當嚴寒之時。行住坐臥。護身周密。故不犯寒毒。彼奔馳荷重。勞房之人。皆辛苦之徒也。當陽閉藏而反擾動之。則鬱發腠理。津液強潰。爲寒所薄。膚腠緻密。寒毒與榮衛相渾。當是之時。壯者氣行則已。怯者則着而成病矣。其即時而病者。頭痛身疼。肌膚熱而惡寒。名曰傷寒。其不即時而病者。寒毒藏於肌膚之間。至春夏陽氣發生。則寒毒與陽氣相薄於榮衛之間。其病與冬時即病無異。

但因春温氣而變名曰温病。因夏熱氣而變名曰熱病。温熱二名。直以熱之多少爲義。陽熱未盛爲寒所制。病名爲温。陽熱已盛寒不能制。病名爲熱。故大醫均謂之傷寒也。

（三十二）　問三日已前當汗。三日已後當下。古人云。未滿三日者可汗而已。其滿三日者可泄而已。此大略之言耳。病人有虛有實。邪氣傳受。遲速不等。豈可拘以日數。仲景云。日數雖多。但有表證而脈浮者。由宜發汗。日數雖少。若有裏證而脈沉者。即宜下之。正應隨脈以汗下之。（傷寒固有始得病便變陽盛之證。須便下之。又有胅理寒。一二日便成少陰病者。須急温之。）又況六氣之邪。乘虛入經。自背得之。則入太陽。或入少陰。（緣少陰有伏脈在背。）自面感之。則入陽明之類。不必皆始於太陽。兼寒邪有首尾止在一經。或間傳一二經。不可以一理推。但據脈與外證治之。此活法也。假令有人脈浮頭項強痛。發熱而惡寒。每日如此。不以日數多少。止是太陽經受之。其餘經絡皆倣此。大抵傷寒憑脈與外證以汗下之。若過日多。脈尚大浮數。按之不足者。尚責太陽也。可發汗而愈。若按之實者。汗之必死。須下之而愈也。若始得病脈細沉數。外證或腹滿咽乾。或口燥舌乾而渴。爲正責屬裏。可下之而愈。若無此證。但發熱脈沉者。誤下必死。須行麻黄附子甘草湯（正二十二）麻黄細辛附子湯（正二十三）小發汗。此皆仲景之確論也。

（三十三）　問陽虛陰盛。汗之則愈。下之則死。陽盛陰虛。汗之則死。下之則愈。素問云。陽虛則外寒。陰虛則内熱。陽盛則内熱。陰盛則外寒。故治傷寒者。陽虛陰盛。汗之則愈。下之則死。陽盛陰虛。汗之則死。下之則愈也。陰陽虛盛。非謂分脈尺寸也。表陽也。裏陰也。外臺云。表病裏和。汗之則

愈。表和裏病。下之則愈。亦只是論表裏陰陽以汗下之。（難經云。陰陽虛實者說脈也。素問云。陰陽虛盛者說裏也。仲景論傷寒汗下。故引素問表裏之義。與外臺所論合矣。）○大抵榮衞爲表屬陽。胃腑爲裏屬陰。寒毒爭於榮衞之中。必發熱而惡寒。尺寸俱浮大。內必不躁。設有微煩。其人飲食欲温而惡冷。爲陽虛陰盛也。汗之則愈。誤下則死。○若寒毒相薄於榮衞之內。而陽勝陰衰。極陰變陽。寒盛生熱。而陽熱之氣盛而入裏。熱毒居胃。水液乾涸。躁糞結聚。其人外不惡寒。必蒸蒸發熱而躁。甚則讝語。其脈浮滑而數。或洪實。爲陽盛陰虛也。下之則愈。誤汗則死。

謹按黃帝素問調經論云。陽虛則外寒。陰虛則內熱。陽盛則外熱。陰盛則內寒。蓋陽主外而陰主內。又曰。陽虛陰盛。汗出而愈。下之則死。陽盛陰虛。汗出而死。下之則愈。今三十三問誤寫作陽盛則內熱。陰盛則外寒。繩詳內外寒熱不同。則汗下差誤。便分死生。又按將作監簿王宗正難經疏義有陰陽盛虛汗下圖。與素問合。以理考之。此是三十三問誤寫。合行刊正。勿誤後人。

（三十四）問仲景有發汗者。有和解之者。

傷寒表證須看榮衞淺深。故仲景有正發汗湯劑。如麻黃湯（正二十）桂枝湯（正一）大青龍湯（正三五）是也。有和解其表。如小青龍湯（正三六）桂枝麻黃各半湯（正二）白虎湯（正六四）桂枝二越婢一湯（正四）柴胡桂枝湯（正三十一）小柴胡湯（正二十九）之類是也。後人不能深究寒熱淺深。藥性緊慢。一概用藥。因茲天傷。其間縱獲生全。往往汗後虛乏。遂致勞復。或變生百病。淹引歲月。卒至不救。此皆由汗下過度。陰陽並竭。血氣羸損。以致此禍。如遇病輕。但當和解之。所謂和其榮衞以通津液。令其自解也。

（三十五）問仲景有宜下之有微和其胃氣者。

傷寒裏證須看熱氣淺深。故仲景有宜下之。如大承氣湯、（正四一）小承氣湯、（正四二）十棗湯、（正八九）大柴胡湯（正三十）是也。有微和其胃氣。如調胃承氣湯、（正四三）脾約圓、（雜六六）少與小承氣、（正四二）微和之之類是也。金匱玉函云。虛者十補勿一瀉。強實者瀉之。虛實等者瀉勿大洩之。故王叔和序傷寒有承氣之戒。○又問轉藥孰緊。答曰。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣湯又次之。大柴胡又次之。仲景治法。蕩滌熱積。皆用湯液。不得用圓子藥。不可不知也。（大柴胡加大黃。小柴胡加芒硝。方爲轉藥。蓋爲病輕者設也。）

（三十六）問傷寒一日頭疼口乾煩滿而渴。二日腹滿身熱不欲食讝語。三日耳聾囊縮而厥。水漿不入。不知人。

此名兩感傷寒也。兩感者。表裏俱病也。太陽與少陰爲表裏。陽明與太陰爲表裏。少陰與厥陰爲表裏。陰陽雙傳。臟腑俱病。此爲難治。六日而死矣。故一日太陽與少陰俱病。則頭痛口乾煩滿而渴。二日陽明與太陰俱病。則腹滿身熱不欲食讝語。三日小陽與厥陰俱病。則耳聾囊縮而厥。仲景無治法。但云兩感病俱作。治有先後。發表攻裏。本自不同。尋至第三卷中。言傷寒下之後復下利不止。身疼痛者。當急救裏。宜四逆湯（正七五）復身體疼痛清便自調者。急當救表。宜桂枝湯（正一）。遂以意尋比倣傚。治兩感有先後。宜先救裏。若陽氣內正。卽可醫也。內才正。急當救表。蓋內尤爲急。才温內。則急救表。亦不可緩也。

（三十七）問傷寒已經發汗吐下仍不解。（古人謂之壞病。）

仲景云太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者爲壞病桂枝不中與也當知何逆隨證治之又云太陽病不解轉入少陽者脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下其脈沉緊者可與小柴胡湯（正二十九）若已吐下發汗小柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之蓋爲病中又感異氣變爲壞病以時令寒暑燥濕風氣不節脈息與少陽相異（小柴胡證罷證候與傷寒不同桂枝不中與也）明當消息其由以法治之若脈尺寸俱盛重感於寒變爲溫瘧（先熱後寒名曰溫瘧在第六卷四十四問）陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變爲風溫（四支不收）頭疼身熱常自汗出在第六卷四十五問）陽脈浮數陰脈實大更遇溫熱變爲溫毒爲病最重（春月肌肉發斑名曰溫毒在第六卷又五十問）陽脈濡弱陰脈弦緊更遇溫氣變爲溫疫（一歲之中長幼疾狀多相似感四時不正之氣在第六卷四十六問）脈證之變方治不同仲景謂溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經而取之也又有傷寒過經再受熱邪留畜臟腑病候多變久而不差陰陽無復綱紀及傷寒解後虛羸少氣皆名壞傷寒也（知母麻黃湯（雜二十八）繁甲散（雜二十九）黑奴圓（雜二十）檢方與病證相參選用之若傷寒解後虛羸少氣氣逆吐者竹葉石膏湯主之（正九五）

類證活人書卷第六

此一卷論傷寒、傷風、熱病、中暑、温病、温瘧、風温、温疫、中濕、濕温、痙病、温毒之名。天下之事。名定而實辨。言順則事成。又況傷寒之名。種種不同。若識其名。縱有差失。功有淺深。效有遲速耳。不得其名。妄加治療。往往中暑。乃作熱病治之。反用温藥。濕温乃作風温治之。復加發汗。名實混淆。是非紛亂。性命之寄。危於風燭。今於逐問下詳載疾狀而名之曰某病。庶幾因名識病。因病識證。如暗得明。胸中曉然。而處病不差矣。

（三十八）問脈浮而緊。濇頭疼身體拘急。惡寒無汗。寒多熱少。面色慘而不舒。腰脊疼痛。手足指末微厥。不煩躁。

此名傷寒也。傷寒之候。發熱惡寒。頭疼腰脊痛。脈緊無汗。宜發汗而解。麻黄湯主之。（正二十）輕者只與桂枝麻黄各半湯。（正二）又人參順氣散。（雜三十）葱豉湯。（雜七四）蒼朮散。（雜三一）麻黄葛根湯。（雜廿二）可選而用之。○然太陽病亦有熱多寒少者。須子細看脈與證也。熱多寒少不嘔清便自可。宜桂枝麻黄各半湯。日脈浮者。雖熱多寒少。自可發汗。若脈弱者。無陽也。桂枝二越婢一湯主之。（正四）熱多寒少而尺脈遲者。榮氣不足。血少故也。先以小建中湯（正三十七）加黄耆最良。尺脈尚遲。再作一劑。○或太陽證宜汗而其人適失血及下利。則頻頻與少桂枝湯（正乙）使體潤。數數連日。當自解。○假如淋家衄血家法不可汗。亦可用小柴胡（正廿九）之類和解之。

（三十九）問脈浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼惡風熱多寒少其面光而不慘煩躁手足不冷此名傷風也傷風之候頭疼發熱脈緩汗出惡風當須解肌宜桂枝湯主之（正一）輕者只與柴胡桂枝湯（正卅二）敗毒散（雜卅三）可選用之治太陽中風有汗用桂枝湯（凡脈緊必無汗唯濡而緊却自汗勿誤用小建中湯也（正卅七）須是脈浮而緩者方可用桂枝也）項背強者桂枝湯加葛根也（正十八）本草葛根主傷風有濕開腠解肌蓋桂枝加葛根者謂中風有濕當加之去其風濕取微汗者風濕去也裏寒者桂枝去芍藥加附子湯也（正八）不飲水者是也凡發汗後汗不止爲漏風桂枝加附子湯主之（正六）腹滿者太陰證脈浮者可服桂枝湯微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯（正十二）痛甚者桂枝加大黃湯也（正十三）○雖然桂枝湯自西北二方居人四時行之無不應驗自江淮間唯冬及春初可行自春末及夏至已前桂枝證可加黃芩半兩（陽旦湯是也雜百十六）夏至後有桂枝證可加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者正用古方不在加減也（岐伯所謂同病異治者此也大抵用溫藥當淳春用熱藥當避夏素問所謂用溫遠溫用熱遠熱者也）○又問傷寒與傷風何以別之傷寒者脈緊而澀傷風者脈浮而緩傷寒者無汗（脈澀故也）傷風者有汗傷寒者畏寒不畏風傷風者畏風不畏寒大抵太陽病者必脈浮發熱惡風惡寒也惡寒者不當風而自增寒惡風者當風而增寒也六經皆有傷寒傷風其證各異太陽脈浮有汗爲中風脈緊無汗爲傷寒陽明善饑爲中風不食爲傷寒少陽兩耳聾目赤胸滿而煩爲中風口苦咽乾目眩爲傷寒若三陰傷風無變異形證但四肢煩疼餘證同三陽

（四十）問有發熱惡寒煩躁手足温而脈反浮緊者有寒多熱少不煩躁手足微冷而脈反浮緩者此名傷風見寒脈傷寒見風脈也蓋發熱惡風煩躁手足温爲中風候脈浮緊爲傷寒脈是中風見寒脈

也。寒多熱少。不煩躁。手足微厥。爲傷寒。候脈浮緩。爲中風脈。是傷寒見風脈也。中風見寒脈。傷寒見風脈。宜服大青龍湯（正卅五）蓋大青龍證脈似桂枝反無汗。病似麻黃反煩躁是也。脈弱有汗爲桂枝證。脈緊不煩躁爲麻黃證。大青龍湯治病與麻黃湯證相似。但病尤重而又加煩躁者。用大青龍湯也。以其中風幷傷寒俱盛故青龍湯添麻黃作六兩。又似合桂枝湯藥味在內添石膏所以爲緊。此治榮衞俱病若證不審。誤用大青龍湯。則發汗多傷人。以其有煩躁一證。故可用大青龍湯。大抵感外風者爲傷風。感寒冷者爲傷寒。故風則傷衞。寒則傷榮。桂枝主傷衞。麻黃主傷榮。大青龍主榮衞俱傷故也。風傷衞者。病在皮膚之間也。以衞行脈外爲陽。主外皮膚之間。衞氣之道路故也。其病淺。寒傷榮者。寒氣中於肌肉也。以榮行脈中爲陰。主內肌肉之間。榮氣之道路故也。其病深。所以桂枝與麻黃所施各異。戒勿誤用。以有淺深之別。風寒之殊。夫醫當宜審諦。大青龍尤宜愼用。仲景云。脈微弱汗出惡風者。不可服青龍。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。類證云。凡發汗過多。筋惕肉瞤。振搖動人。或虛羸之人。微汗出。便有此證。俱宜服眞武湯（正百五）以救之。羸甚者芍藥或量多少與之。惡熱藥者。去附子。餘依加減法。仲景製眞武湯。乃爲合用桂枝。却用麻黃之類。發汗多。亡陽有此證。故用眞武湯。若調理順者。無此證也。

（四十一）問夏月發熱惡寒。頭疼身體支節痛重。其脈洪盛者。此名熱病也。冬傷於寒。因暑氣而發爲熱病。治熱病與傷寒同。有汗宜桂枝湯。（正一）無汗宜麻黃湯。（正二十）加煩躁者。宜大青龍湯。（正卅五）然夏月藥性須帶涼。不可太温。桂枝麻黃大青龍須用加減法。夏至前桂枝加黃芩半兩。夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩。石膏二兩。或加升麻半兩也。蓋桂枝麻黃湯性熱。地暖之處。非西北之比。夏月服之。必有發黃斑出之失。熱病三日外。與湯不差。脈勢仍數。邪氣猶在經絡。未入臟腑者。桂枝石膏湯主之。（雜卅五）此方夏至後代桂枝證用。若加麻黃半兩。可代麻黃青

龍湯用也。古方三月至夏爲晚發傷寒。梔子升麻湯（雜卅六）亦可選用之。○又問夏至後皆可行白虎湯液耶。白虎湯治中暑與汗後一解表藥耳。今之發者。見六月中病。多云中暑。不辨熱病。用藥大涼。又況夏月陰氣在內。最難調治。白虎湯尤宜戒之。

（四十二）問夏月自汗惡寒。身熱而渴。其脈微弱者。

此名中暑也。大抵中暑與熱病外證相似。但熱病者脈盛。中暑者脈虛。以此別之。甲乙經云。脈盛身寒。得之傷寒。脈虛身熱。得之傷暑。蓋寒傷形而不傷氣。所以脈盛。熱傷氣而不傷形。所以脈虛。傷寒即身體支節痛重。其脈洪盛。按之有力。此是冬月感寒深。至夏發耳。中暑即背寒面垢。（其面如塗油。類纂云。面垢者陽證也。一名面塵。若塵埃之著面。）手足微冷。煩渴口燥。但覺倦怠。四肢却不痛重。其脈微弱。按之無力。白虎湯主之。（正六四）痰逆惡寒者。橘皮湯主之。（雜四）不惡寒者。竹葉湯主之。（正九五）頭疼惡心煩躁。心下不快者。五苓散（正六六）最妙。○又問中暑何故洒然毛聳惡寒。答曰。經云。四時八風之中人也。因有寒暑。寒則皮膚急。腠理閉。暑則皮膚緩。腠理開。開則洒然寒。閉則熱而悶。近人多不明中暑。或作熱病法治之。復用溫熱藥。必致發黃斑出。更爲斎血。尤宜戒之。

（四十三）問夏至已前。發熱惡寒。頭疼身體痛。其脈浮緊。

此名溫病也。春月傷寒。謂之溫病。冬傷於寒。輕者夏至已前發爲溫病。蓋因春溫暖之氣而發也。（又非溫疫也。）治溫病與冬月傷寒。夏月熱病不同。蓋熱輕故也。（春初秋末陽氣在裏。其病稍輕。縱不用藥治之。五六日亦自安。）升麻湯（雜一）解肌湯（雜三八）柴胡桂枝湯（正三一）最良。熱多者小柴胡湯主之。（正二九）不渴外有微熱者。小柴胡加桂

枝也。嗽者小柴胡加五味子也。或煩渴發熱不惡寒與虛煩者。並竹葉石膏湯（正九五）次第服之。麻黃桂枝大青龍。唯西北二方四時行之。無有不驗。若江淮間地偏暖處。唯冬月及正初乃可用正方。自春末至夏至已前。桂枝麻黃大青龍內宜加減也。加減法。在熱病門。

（四十四）問病人先熱後寒。尺寸脈俱盛。

此名溫瘧也。先熱後寒。名曰溫瘧。病人尺寸俱盛。重感於寒。變成溫瘧。小柴胡湯主之。（正二九）瘧疾寒熱相等。及先熱後寒者。俱宜與小柴胡湯。先寒後熱者。小柴胡加桂湯。（雜三九）有多熱但熱者。白虎加桂湯。（雜四十）有多寒但寒者。柴胡桂薑湯。（雜四一）有汗多煩渴。小便赤澀。素有癉氣。及不伏水土。嘔吐甚者。可服五苓散。（正六六）脈小緊寒熱嘔吐。間日頻日發作無時。大便祕者。可服大柴胡湯下之。（正三十）脈浮大寒熱往來者。可服祛邪丸吐之。（雜四三）久不愈者。服瘧母煎圓。（雜四一）當自愈。治瘧之法。無以過也。○大抵瘧脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者可下之。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗。浮者可吐之。夏傷於暑。秋必病瘧。此非傷寒之謂。以其壞傷寒有溫瘧一證。故因而及之。

（四十五）問脈尺寸俱浮。頭疼身熱。常自汗出體重。其息必喘。四支不收。嘿嘿但欲眠。

此名風溫也。其人素傷於風。因復傷於熱。風熱相薄。即發風溫。主四支不收。（左傳曰。風淫末疾。）頭疼身熱。常自汗出不解。治在少陰厥陰。（少陰火。厥陰風。）不可發汗。發汗即譫言。獨語內煩躁擾。不得臥。若驚癎目亂。無精。療之者。復發其汗。如此死者。醫殺之也。風溫不可發汗。宜萎蕤湯。（雜四五）風溫身灼熱者。知母乾葛湯。（雜四六）

風温加渴甚者。栝蔞根湯。（雜四七）風温脈浮身重汗出。漢防己湯。（雜四八）

（四十六）　問一歲之中。長幼疾狀多相似。此名温疫也。四時皆有不正之氣。春夏亦有寒凊時。秋冬或有暄暑時。人感疫厲之氣。故一歲之中。病無長少。率相似者。此則時行之氣。俗謂之天行是也。老君神明散。（雜四九）務成子螢火圓。聖散子。（並雜五十）敗毒散。（雜卅三）冬氣温。春氣寒。夏氣冷。秋氣熱。爲時氣。時氣與傷寒同而治有異者。蓋因四時不正之氣而變更。不拘以日數淺深。汗吐下隨證施行。所以聖散子不問表裏陰陽者此也。唯聖散子性差熱。用者宜詳之。若春應暖而凊氣折之。則責邪在肝。三四月或有暴寒。其時陽氣尚弱。爲寒所折。病猶輕。升麻散。（雜一）發肌湯主之。（雜卅八）病熱。夏應暑而寒氣折之。則責邪在心。五月六月陽氣已盛。爲寒所折。病熱則重。七月八月陽氣已衰。爲寒所折。病熱亦微。秋應凉而反大熱。調中湯。（雜五一）射干湯。（雜五二）半夏桂枝甘草湯。（雜五三）可選而用之。秋應凉而反大熱。抑之則責邪在肺。濕熱相薄。民多病癉。癉者黄也。宜白虎加蒼朮湯。（雜百十七）煎茵蔯汁調五苓散。（正六十六）冬應寒而反大温。抑之則責邪在腎。其冬有非節之暖者。名爲冬温。此屬春時陽氣發於冬時。則伏寒變爲温病。宜萎蕤湯。（雜四五）仲景云。冬温之毒。與傷寒大異。蓋傷寒者。傷寒氣而作。冬温者。感温氣而作。寒疫者。暴寒折人。非觸冒之過。其治法不同。所施寒熱温凉之劑亦異。不可拘以日數。發汗吐下。隨證施行。要之治熱以寒。温而行之。治温以凊。冷而行之。治寒以熱。凉而行之。治凊以温。熱而行之。以平爲期。不可以過。此爲大法。

（四十七）　問一身盡痛。發熱身黄。小便不利。大便反快者。此名中濕也。風雨襲虚。山澤蒸氣。人多中濕。濕流關節。須身體煩痛。其脈沉緩爲中濕。（脈細者非也。）主一身盡痛。發熱身黄。小便自利者。朮附湯。（正七十）若小便不利。大便反快。當利其小便。宜甘草附子湯。（正七一）

五苓散（正六六）主之。至眞要論云。治濕之法。不利小便。非其治也。金匱要略云。濕家身煩痛。可與麻黃湯加白朮四分。發其汗。愼不可以火攻之。濕家雖身體痛。不可太發汗。汗出則作痓。大抵中濕者。水濕之蒸氣。及汗出當風。取冷過度。或中霧露與風寒氣合者曰痹。皆由中於濕而後挾以異氣。其寒多者爲痛。爲浮腫。非附子桂朮不能去也。其風多者爲煩熱。爲流走。爲拘急。非麻黃薏苡烏頭輩不能散也。其中氣者爲堅滿。爲癖閉。非甘遂芫花大戟枳朮不能泄也。

（四十八）問支體痛重。不可轉側。額上微汗。不欲去被。或身微腫。此名風濕也。脈浮爲風濕。是風氣與濕氣相薄。肢體痛重。不可轉側。額上微汗。不欲去被。或身微腫。欲發汗。但穀穀身潤。則風濕俱去。若大發其汗。則風氣去濕氣在矣。麻黃杏子薏苡甘草湯、（雜五四）防己黃蓍湯、（雜五五）桂枝附子湯、（正六九）桂枝加白朮湯、甘草附子湯、（正七一）朮附湯（正七十）杏仁湯、（雜五六）敗毒散、（雜卅三）可選而用之。身腫者。甘草附子湯加防風。

（四十九）問兩脛逆冷。胸腹滿。多汗。頭目痛苦妄言。此名濕溫也。其人嘗傷於濕。因而中暑。濕熱相薄。則發濕溫。病苦兩脛逆冷。腹滿。又胸多汗。頭目痛苦妄言。其脈陽濡而弱。陰小而急。治在太陰（脾屬土主濕）。不可發汗。汗出必不能言。耳聾。不知痛所在。身靑面色變。名曰重腸。如此死者。醫殺之耳。白虎加蒼朮湯（雜百十七）主之。（此方出傷寒微旨。亦倣金匱白虎加桂湯。）（雜四十）

（五十）問發熱惡寒。頸項強急。腰身反張。如中風狀。或痰瘈口噤。此名痓也。傷風頸項強急。身體反張。屬太陽經。先因傷風。又感寒濕而致然也。古人謂之痓病。（痓音懺。又作瘨。巨郢反。）痓者。強直也。古人以強直爲痓。金匱要略云。太陽病。其身體几几。便爲痓也。外證發熱惡寒。與傷寒相似。但其脈沉遲弦細。而項背反張強硬。如

發癍之狀。此爲異耳。（新產血虛多汗出喜中風亦有此證。）當察其有汗無汗。以分剛痙柔痙。（無汗惡寒名剛痙。有汗不惡寒名柔痙。）無汗葛根湯主之。（正廿六）有汗桂枝加葛根湯（正十八）主之。（本草葛根主傷風有濕開竅解肌。）凡剛柔二痙。小續命湯（雜五七）並可與之。（有汗者小續命湯去麻黃加葛根也。）若審知剛痙。胸滿口噤。其人臥不着席。脚攣急。咬齒。當行大承氣湯。（正四一）（外臺云。熱而痙者死。熱病痙者。反折瘈瘲。齒噤齘也。）○又問剛柔二痙。與陰陽二痙是如何。痙亦作痙。陽痙屬剛痙。陰痙屬柔痙。附尤散。（雜五八）桂心白朮湯。（雜五九）附子防風散。（雜六十）八物白朮散。（雜六一）桂枝煮散。可選而用之。（活人續集解惑論云。合面而臥爲陰痙。仰目者爲陽痙。又云或因濕家發汗多。則發痙也。）

（又五十）問初春病人肌肉發斑癮疹如錦紋。或咳心悶。但嘔清汁。此名溫毒也。溫毒發斑者。冬時觸冒疹毒。至春始發。病初在表。或已發汗吐下而表證未罷。毒氣不散。故發斑。黑膏主之。又有冬月溫煖。人感乖戾之氣。冬未卽病。至春或被積寒所折。毒氣不得泄。至天氣暄熱。溫毒始發。則肌肉斑爛癮疹如錦紋而咳心悶。但嘔清汁。葛根橘皮湯主之。（雜九四）黃連橘皮湯（雜百廿五）尤佳。

類證活人書卷第七

此一卷論痰證、食積、虛煩、脚氣、與傷寒相似。實非傷寒也。所謂朱紫相陵。玉石不分。醫者處病滅裂。見其發熱惡寒。往往作傷寒治之。發汗吐下。因茲夭橫者多矣。今特立一門。別而論之。庶幾覽者知其非傷寒也。

（五十一）問。增寒發熱。惡風自汗。寸口脈浮。胸膈痞滿。氣上衝咽喉不得息。而頭不疼。項不強。此爲有痰也。中脘有痰。亦令人憎寒發熱。胸膈痞滿。有類傷寒。但頭不疼。項不強爲異。宜服柴胡半夏湯、（雜六二）金沸草散（雜六三）大半夏湯（雜六四）若氣上衝咽喉不得息者。用瓜蒂散吐之。古法服瓜蒂散（正百十一）凡服壹錢匕。藥下便臥。欲吐且忍之。良久不吐。取叁錢匕。湯二合和服。以手指撚之便吐矣。不吐。復稍增之。以吐爲度。若吐少病不除。明日如前法再服之。可至再三。不可令人虛也。藥力過時不吐者。啜熱湯一升。以助藥力。吐訖便可食。無復餘毒。若服藥過多者。飲水解之。

（五十二）問。頭疼脈數。發熱惡寒。而身不痛。左手脈平和。此名食積也。傷食亦令人頭痛。脈數發熱。但驗左手人迎脈平和。身不疼痛者是也。甲乙經云。人迎盛緊傷於寒。氣口盛緊傷於食。（左手關前一分者。人迎之位也。右手關前一分者。氣口之位也。）蓋人迎主外。氣口主中。以此別之。傷食之證。由脾胃伏熱。因食不消。發熱似傷寒。却身不疼痛。此爲異耳。若腸實嘔吐者。食在上脘。宜吐之。若心腹滿痛者。

宜下之治中湯（雜百十五）五積散、（雜廿一）黑神圓、（雜六七）可選而用也。

（五十三）　問不惡寒身不痛頭不疼脈不緊但煩熱者。

此名虛煩也。諸虛煩熱與傷寒相似。然不惡寒身不疼痛。故知非傷寒也。不可發汗。頭不痛。脈不緊數。故知非裏實也。不可下。如此者。內外皆不可攻。攻之必遂損竭多死也。此虛煩。但當與竹葉湯（正九五）若嘔者與橘皮湯（雜廿七）一劑不愈。再與之。孫眞人云。此法數用甚有効。傷寒虛煩。亦宜服之。王叔和云。有熱不可大攻之。熱去則寒起。正宜服竹葉湯。

（五十四）　問傷寒頭疼身熱。支節痛。大便祕。或嘔逆而脚屈弱者。

此名脚氣也。傷寒只傳足經。不傳手經。地之寒暑風濕皆作蒸氣。足常履之。遂成脚氣。所以病證與傷寒相近。（其脈浮而弦者。起於風。濡而弱者起於濕。洪而數者起於熱。遲而澁者起於寒。風者汗而愈。濕者溫而愈。熱者下而愈。寒者熨而愈。）脚氣之病。始得不覺。因他病乃知。毒氣入心。則小腹頑痺不仁。令人嘔吐死。在朝夕矣。然終是與傷寒不同者。孫眞人云。卒起脚屈弱不能轉動。有此爲異耳。要之有脚氣之人。先從脚起。或先緩弱疼痺。（寒氣勝者爲痛痺。有寒故痛也。）或行起忽倒。或兩脛腫痛。（亦有病久深者。）或脚膝枯細。或心中忪悸。或小腹不仁。（榮衞之行澁。皮膚不榮。故爲不仁。不仁者。皮頑不知有無也。）或舉體轉筋。或見食嘔逆。惡聞食氣。或胸滿氣急。或遍體酸痛。皆脚氣候也。黃帝所謂緩風濕痺是也。頑弱名緩風。疼痛爲濕痺。（痺者閉也。閉而不仁。故曰痺也。）寒中三陽。所患必冷。越婢湯（雜六五）小續命湯（雜五七）主之。小續命煎湯成。旋入生薑自然汁最快。暑中三陰。所患必熱。小續命湯去附子減桂一半。大煩躁者。紫雪最良。

大便祕者。脾約圓（雜六十六）神功丸（雜六八）五柔丸（雜六九）大三脘散（雜七十）木瓜散（雜七三）主之。脚氣之疾。皆由氣實。而始終無一人以服藥致虛而死者。頭

痛身熱。支節痛而脚屈弱者。是其人素有脚氣。此時發動也。脚腫者。檳榔散主之。（雜七十一）脚氣方論、千金、外臺、最詳。此不復敍。大抵越婢湯、小續命湯、薏苡仁酒法（雜七二）脾約神功圓皆要藥也。仍鍼灸爲佳。服補藥與用湯淋洗者。皆醫之大禁也。

類證活人書卷第八

此一卷論發熱。大抵傷寒。寒多易治。熱多難愈。傷寒發熱者。以其寒極則生熱。治法多用冷藥。故令熱不去。仲景熱多寒少。用桂枝二越婢一湯。不渴外有微熱者。用小柴胡加桂湯。皆温表之義也。近時多行小柴胡湯。不問陰陽表裏。凡傷寒家。皆令服之。此藥差寒。不可輕用。雖不若大柴胡湯。小承氣湯之緊。然藥病不相主。其爲害一也。往往因服小柴胡湯而成陰證者甚多。仲景雖云傷寒中風有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。此爲是少陽證。當服小柴胡。不必少陽證悉具耳。況本方又有加減隨證增損。古人方治。審諦如此。後人妄投。良可怪也。

（五十五）問發熱

發熱而惡寒者。屬太陽也。太陽病必發熱而惡寒。蓋太陽主氣以温皮膚分肉。寒氣留於外。皮膚緻密。則寒慄而發熱。宜發其汗。麻黄湯（正方二十）大青龍湯（正方三十五）主之。若發熱微惡寒者。柴胡桂枝湯。（正方三十一）桂枝二越婢一湯（正方四）主之。若吐利而發熱惡寒者。霍亂也。太陽病發熱而渴。不惡寒。爲温病。若發汗已。身體灼熱者。爲風温也。○身熱汗出濈濈然者。屬陽明也。陽明病脈浮者。宜桂枝（正方一）微汗之。脈實者。調胃承氣湯下之。（正方四三）大便不祕者。白虎湯和解。（正六十四）若陽明病發汗多者。宜大承氣湯急下之。（正四十一）蓋汗多發熱者。胃汁乾故也。仲景云。太陽證汗後不惡寒。但熱者。實也。當和其胃氣。宜調胃承氣湯。（正四二）太陽病三日發汗不解。蒸蒸發熱者。屬於胃也。宜下之。○脈細頭疼嘔而發熱者。屬少陽也。少陽發熱。小柴胡湯主之。（正二十九）不可發。○病人不渴。外有微熱者。小柴胡加桂也。（雜三十九）小柴胡加桂主表熱最良。此法不特傷寒也。仲景表有熱者。小柴胡加桂也。裏有熱者。白虎加人參也。（正六五）大抵身熱不飲水者。爲表熱也。口燥煩渴者。爲裏熱也。二藥均治發熱。然分表裏。不可不知也。○發汗已。身灼熱者。名風温。風熱也。其人素傷於風。汗。發汗即譫語。

因復傷於熱．風熱相薄．卽身熱常自汗出．此名風溫．在第六卷第四十五問也．〇病人無表裏證．發熱七八日．脈雖浮數．宜大柴胡湯下之．（正方三十）大便祕者．加大黃．〇假令已下脈數不解．今熱則消穀善饑．至六七日不大便者．有瘀血也．抵當湯主之．（正九十一）〇若傷寒差後更發熱者．小柴胡湯（正二十九）主之．脈浮者．以汗解．脈實者．可下之．〇又問陰證有發熱者乎．太陰厥陰皆不發熱．只少陰發熱有二證．仲景謂之反發熱也．少陰病初得之．發熱脈沉者．麻黃細辛附子湯（正廿三）主之．少陰病脈沉．發汗則動經．此大略之言耳．脈應裏而發熱在表．亦當以小辛之藥泄汗而溫散也．仲景云．傷寒之病．從風寒得之．表中風．寒入裏．則不消．須用溫藥少汗而解．少陰病下利清穀．裏寒外熱．手足厥逆．脈不出者．通脈四逆湯主之．（正八十一）大抵陰證發熱．終是不同．脈須沉．或下利手足厥也．

（五十六）問熱多寒少

太陽熱多寒少．有三證．有熱多寒少而不嘔．清便自可者．有熱多寒少而脈微弱者．有熱多寒少而尺脈遲者．其用藥皆不同也．〇太陽病八九日．如瘧狀．熱多寒少．不嘔．清便自可．宜桂枝麻黃各半湯．（正方二）〇熱多寒少而脈都大微弱者．無陽也．不可發汗．宜桂枝二越婢一湯（正方四）主之．若脈浮雖熱多寒少．亦自可發汗也．〇熱多寒少而尺中遲者．血少也．先以小建中加黃耆（正卅七）以養其血．尺尙遲．再作一劑．然後睟時用小柴胡湯（正二十九）桂枝二越婢一湯（正方四）輩小劑隨證治之．

（五十七）問潮熱．

潮熱者．大率當下．仲景云．潮熱者實也．大承氣湯證云．其熱不潮．未可與也．則知潮熱當下無疑矣．雖然．

更看脈與外證。脈若弦若浮。及外證惡寒。猶有表證。且與小柴胡湯以解之。（正二十九）若腹大滿不通者。可與小承氣。（正四十二）微和其胃氣。勿令大泄也。（仲景云。日晡發熱者屬陽明也。脈實者大承氣。（正四二）大柴胡也。（正三十）脈虛者。桂枝也。（正方一）縱使潮熱。當行大承氣。亦須先少與小承氣。若不轉失氣。不可攻之。後發熱復硬者。大柴胡下之。（正三十）○若胸脇滿而嘔。日晡發潮熱者。小柴胡加芒硝（正三十四）主之。○又有日晡發潮熱已而微利者。又有微發潮熱而大便溏者。或潮熱而咳逆者。皆當用小柴胡也。（正二十九）傷寒十二日不解。胸脇滿而嘔。日晡發潮熱已而微利潮熱者。實也。先服小柴胡以解外。後以柴胡加芒硝湯下之。陽明潮熱。○冬陽明潮熱。當行黃芩湯。冬陽明病脈浮而緊。必發潮熱。發作有時。但脈浮者。必盜汗。黃芩湯主之。（正八十五）已上潮熱。並屬陽明也。○太陽有潮熱乎。仲景大陷胸湯一證。（正三十八）結胸有潮熱者。爲大結胸。屬太陽也。

（五十八）問往來寒熱者。陰陽相勝也。陽不足則先寒後熱。陰不足則先熱後寒。往來寒熱有三證。小柴胡湯、大柴胡湯、柴胡桂枝乾薑湯。○有表證而往來寒熱者。用小柴胡也。（正二十九）○有裏證而往來寒熱者。大柴胡也。（正三十）○已表或已下而往來寒熱者。皆可用柴胡桂枝乾薑湯也。（正三十二）○仲景云。血弱氣盡腠理開。邪氣因入與正氣分爭。往來寒熱。休作有時。小柴胡主之。又云。傷寒五六日中風。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲食。心煩喜嘔。或胸煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞕。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡主之。傷寒十餘日。熱結在裏。往來寒熱者。大柴胡主之。傷寒五六日已發汗。復下之。胸脇滿。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。往來寒熱。心煩。柴胡桂

枝乾薑湯也。

（五十九）　問傷寒瘧狀

形證似瘧。有太陽證。有陽明證。有婦人熱入血室證。○太陽證。服桂枝湯。（正方一）大汗出。脈洪大者。與桂枝湯如前法。若形似瘧。一日再發者。汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。（正三）傷寒八九日如瘧狀。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。日一二發者。麻黃桂枝各半湯。（太陽證形似瘧寒熱等者。與桂枝二麻黃一湯。熱多寒少者。麻黃桂枝各半湯。正方二）○有陽明證。病人煩熱。汗出如瘧狀。日晡發熱。而脈浮虛者。與桂枝湯。脈實者。宜承氣湯。（正四二）○婦人熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。小柴胡湯主之。（正二十九）

（六十）　問汗之而寒熱者

太陰證。發汗後。依前寒熱者。須看脈如何。若脈浮數。或洪大。則表證猶在。當再表也。如桂枝湯、（正方一）或桂枝二麻黃一（正方三）之類。醫人爲見已汗、或已下而發寒熱。不敢再表。誤矣。蓋脈浮爲在表。表之必愈也。○或得汗而解。復如瘧狀。日晡而發者。此屬陽明也。若脈實者。可下之。宜大柴胡、（正三十）大承氣（正方四一）也。○若發汗後。只惡寒者。虛也。發汗後。只發熱者。實也。只惡寒屬芍藥甘草附子湯。（正七二）只發熱屬調胃承氣湯。（正方四三）○若厥陰證。大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。（正七五）

（六十一）　問汗之而仍發熱者

素問云。溫病汗出輒復熱而脈躁疾。不爲汗衰。狂言不能食。謂之陰陽交。交者死也。又云。熱病已得汗而脈躁盛者死。今不與汗相應。是不勝其病也。其死明矣。大抵病人得汗而脈靜者生。今汗之而仍發熱者。若脈浮數。則表證猶在。汗之必愈也。（仲景云。發汗解半日許復熱煩。脈浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。（正一）發汗後不敢再表者。爲脈沉實耳。脈若浮者。須再汗也。發汗後不惡寒。只發熱。脈沉實。或狂語。此爲胃實。陽盛。卽不可再汗也。須當下之。設令下後。又不解。表裏邪亦衰矣。（仲景云。太陽病三日發汗不解。蒸蒸發熱者。宜調胃承氣湯。（正四十三）和其胃氣也。太醫云。若傷寒得汗後。熱不退。發昏及狂言者。便可用承氣湯。（正四十二）下之立愈。未差再服。）若汗後熱不解。但心下痞。嘔逆。又自利。大柴胡去大黃主之。（正方三十）○又有太陽證合行桂枝。却用麻黃之類。發汗多亡陽。仍發熱者。眞武湯（正方一百五）主之。○更有風溫一證。初得病發熱而渴。不惡寒。雖發汗已。身灼熱者。爲風溫。白虎加蒼朮湯。（雜四十五）岐伯所謂汗出而身熱者。風熱也。○若傷寒得汗後。病解。虛羸。微熱不去。可行竹葉石膏湯。（正方九五）隨其虛實而治之。

（六十二）　問下之而熱不退者。勞復食復附。

仲景云。病人脈微而濇。爲醫所病。大發其汗。使陽氣微。又大下之。使陰氣弱。其人亡血。病當惡寒。後乃發熱。無休止時。蓋陽微則惡寒。陰弱則發熱。陽微惡寒。四逆湯主之。（正七十五）陰弱發熱。爲內熱。葶藶苦酒湯主之。（雜方十六）大抵傷寒八日已上。大發熱者。此爲難治。（仲景云。脈陰陽俱虛。熱不止者死。）又有醫人多用圓子藥下之。身熱不去。微煩者。梔子乾薑湯主之。（正方四九）傷寒五六日大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。梔子豉湯主之。（正方四十五）○又問傷寒差後發熱者何也。此名勞食復也。病新差。血氣尙

虛津液未復。因勞動生熱。熱氣既還。復入經絡。名曰勞復。仲景云。傷寒差已後。更發熱。小柴胡湯主之。（正二十九）脈浮者以汗解。宜柴胡桂枝湯。（正三十一）脈實者以下解。宜大柴胡湯。（正方三十）又大病差後勞復者。枳實梔子湯主之。（正方九十六）麥門冬湯（雜一百二十六）雄鼠屎湯（雜七十七）七味葱白湯（雜一百十八）皆可選用。○又食復者。大病新差。脾胃尚弱。穀氣未復。強食過多。停積不化。因爾發熱。名曰食復。大抵新病差。多因傷食。便作痞。乾噫。食臭。腹中雷鳴。下利等證。仲景於枳實梔子湯證云。若有宿食。內大黃如薄棊子五六枚。服之愈。可與生薑瀉心湯。（正方六十二）黃帝曰。熱病已愈。時有所遺者。何也。岐伯曰。諸遺者。熱甚而強食。故有所遺也。若此者。皆病已衰。而熱有所藏。因其穀食相薄。兩熱相合。故有所遺也。帝曰善。治遺柰何。岐伯曰。視其虛實。調其逆從。可使必已。食肉則復。多食則遺。此其禁也。

類證活人書卷第九

此一卷首論惡寒。大抵太陽病。必發熱而惡寒。惡寒家。愼不可過當。覆衣被及近火氣。寒熱相薄。脈道沉伏。愈令病人寒不可遏。但去被徹火。兼飲以和表之藥。自然不惡寒矣。婦人惡寒。尤不可近火。寒氣入腹。血室結聚。鍼藥所不能治矣。

（六十三）問惡寒

惡寒有二證。發熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。發於陽者宜解表。脈必浮數。屬桂枝湯、（正方一）桂枝二越婢一湯、（正四）麻黃湯、（正方二十）青龍湯（正方三十六）證也。發於陰者宜温裏。脈必沉細。屬理中湯、（正方七十四）四逆湯（正方七十五）證也。少陰病下利已。惡寒而蹙。手足温者可治。宜建中湯。（正方二十七）若少陰病惡寒而蹙。時時自煩。不欲厚衣。用大柴胡湯下之。（正方三十）若發熱微惡寒者。屬柴胡桂枝湯也。（正方三十一）發汗後反惡寒者。虛故也。屬芍藥甘草附子湯。（正七十二）脈微而惡寒者。此陰陽俱虛也。不可更吐下也。發汗面色赤有熱者。爲欲解。宜桂枝麻黃各半湯。（正方二）傷寒大下後。復發其汗。心下痞惡寒者。表未解也。不可攻其痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。（正方一）攻痞大黃黃連瀉心湯。（正方五十九）雖然。太陽陽明少陰皆有惡寒。要之。太陽病或已發熱。或未發熱。必惡寒也。陽明證俱宜下。唯惡寒中寒爲病在經。與太陽合病屬表。發其汗耳。若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡寒者。白虎證也。（正方六十四）

○又問有汗出惡寒者有汗出多而微惡寒者有頭汗出而微惡寒者何也仲景云太陽病其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之（正方六十）陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯也（正方一）頭汗出而微惡寒者屬少陽宜小柴胡湯也（正方二十九）○又問背惡寒者何也背惡寒有兩證三陽合病背惡寒者口中不仁口燥舌乾也少陰病背惡寒者口中和也以此別之口中不仁口燥舌乾而背惡寒者白虎加人參湯主之（正方六十五）口中和而背惡寒者附子湯主之（正方六八）仍灸之仲景云少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

（六十四）問惡風

惡風者衛中四時之虛風所以惡風也其人當汗出而脈緩也數與桂枝湯（正方一）桂枝加葛根湯（正方十六）使遍體微潤連日當自解矣○又有太陽病發汗多亡陽遂漏不止衛虛而惡風者當溫其經也其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子也（正方六）○若傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯也（正方二十九）○風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之（正方二十二）

（六十五）問傷寒不得汗

甲乙經云熱病脈常躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁而得汗者生大抵傷寒榮衛俱病則無汗麻黃湯（正方二十）葛根湯（正方二十六）大青龍湯（正方二十五）葱豉湯（雜方七十四）可選而

用之。○若傷寒連服湯劑而汗不出者。死。如中風法。蒸之。溫熱之氣於外迎之。無不得汗也。薪火燒地良久。掃除去灰。可以水洒之。取蠶沙柏葉桃葉麩皆可用。相和。鋪燒地上。可側手厚。上鋪席。令病人當上臥。溫覆之。夏月熱。只布單覆之。汗移時立至。俟周身至脚心皆汗。粟粟。乃用溫粉撲上汗。移上牀。最得力者。蠶沙桃柏葉也。無蠶沙亦得。單桃柏葉亦得。葫蘆亦可。用麩糠。乃助添令多爾。不用亦得。○傷寒亦有氣虛不能作汗者。仲景云。脈浮而遲。遲爲無陽。不能作汗。其身必痒。宜桂枝加黃各半湯主之。（正方二）陽明病法。多汗反無汗。如蟲行皮中狀者。此久虛故也。宜芍附湯（正方七十）黃耆建中湯。（正方三十七）

（六十六）問自汗

傷寒無汗者七證。自汗者九證。太陽傷寒、剛痓病、太陰病、少陰病、厥陰病、陰易病、冬陽明病、皆無汗。凡少陰證無汗。類瘧黃湯之證。脈陰陽俱緊。少陰脈微細爲異也。又汗出爲陽微。故仲景云。陰不得有汗。脈陰陽俱緊而反汗出爲亡陽。屬少陰經也。汗出者九證。衝不和自汗。病人藏無他病。時發熱自汗出而不愈者。衛不和也。先其時發汗則愈。屬桂枝也。（正方一）太陽病發熱汗出者。此爲榮弱衛強。故汗出。欲救風邪者。宜桂枝湯。又云病常自汗出者。此爲榮氣和。榮氣和者外不諧也。以衛氣不共榮氣諧故爾。以榮行脈中。衛行脈外。復發其汗。榮衛和則愈。傷風自汗。太陽病發熱汗出惡風。脈緩爲中風。屬桂枝湯。（正方一）又云。太陽病。項背強。几几反汗出惡風。桂枝加葛根湯（正方十六）主之。汗出而渴者。五苓散。（正方六十六）不渴者。茯苓甘草湯。（正五十三）雖然。仲景云。傷風自汗。用桂枝。然桂枝湯難用。須是仔細消息之。假令傷風自汗。若脈浮而弱。設當行桂枝湯。服後無桂枝脈息證候而煩者。即不可再服也。若傷風自汗出而小便數者。切不可與桂枝也。仲景云。太陽病自汗。四支拘急。難以屈伸。若小便難者。可桂枝湯內加附子服之。（正方六）若小便數者。慎不可與桂枝附子湯。宜服芍藥甘草湯。（正方五七）若悞行桂枝附子攻表。便咽乾煩燥。厥逆嘔吐。作甘草乾薑湯。（正五十二）與之以復其陽。若厥愈足溫。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和。讝語者。與調胃承氣湯。（正四十三）微溏則止其讝語。緣芍藥甘草湯。主脈浮自汗。小便數者。寸口脈浮爲風。大爲溫風則生微煩。虛則兩脛攣。小便數。仍汗出爲津液少。不可悞用桂枝。宜服芍藥甘草補虛。退風熱通治。誤服桂枝湯後。病證仍存者。風溫自汗。太陽病發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。若發汗已。身灼熱者。名風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠睡。鼻息必鼾。語言難。屢萎薤湯。（雜四十五）中濕自汗。難經云。何以知傷濕得之。然當喜汗出。不可止。何以言之。腎主濕。故知腎入心爲汗出不可止也。中暑自汗。太陽中熱者。暍是也。其人

汗出惡寒身熱而渴．屬陽明病自汗．不惡寒．反惡熱．濈濈然汗自出者．屬陽明也．若陽明病汗出多而渴者．不可與白虎湯．（正六十四）五苓散．以汗多胃中燥．猪苓復利其小便故也．故仲景云．陽明病發熱汗多者．急下之．陽明病其人汗多以津液外出．胃中燥．大便必硬．讝語者．屬調胃承氣湯．（正一百二）雖然．陽明汗多急下．若小便自利者．此爲津液內竭．雖鞕不可攻之．須自大便導之．宜用蜜煎導法．（正一百二十三）雖然．陽明汗出而脈遲微惡寒者．表未解也．宜桂枝湯．（正方一）陽明法多汗則脈浮．無汗而喘者．發汗則愈．宜麻黃湯．（正方二十）亡陽自汗．太陽病發汗多．遂漏不止．其人惡風．當溫其經．宜桂枝加附子湯．（正方六）傷寒尺寸脈俱緊而汗出者．亡陽也．此屬少陰．法當咽痛而復吐利．其人熱不去．內拘急．四肢疼厥逆而惡寒者．四逆湯（正七十五）主之．汗多不止者．可用溫粉撲之．若汗多不止．必惡風煩躁．不得臥者．先服防風白朮牡蠣湯．（雜二）次服小建中湯．（正三十七）柔痓自汗．太陽病發熱脈沉細．搖頭口噤．背反張．汗出而不惡寒者．名柔痓．小續命湯主之也．（雜五十七）霍亂自汗．吐利汗出．發熱惡寒．四肢拘急．手足厥冷者．四逆湯主之．（正七十五）雖然．少陰不得有汗．而少陰亦有反自汗出之證．陰證四支逆冷．額上及手背冷．汗濈濈者．亡陽也．陽明病法多汗而陽明亦有反無汗之證．不可不察也．

（六十七）問頭汗出

病人表實裏虛．玄府不開．則陽氣上出．汗見於頭．凡頭汗出者．五內乾枯．胞中空虛．津液少也．愼不可下．下之者謂之重虛．然頭汗出者．有數證．傷寒五六日頭汗出．微惡寒．手足冷．心下滿．口不欲食．大便鞕．脈細者．此爲陽微結．必有表復有裏也．脈沉亦有裏也．汗出爲陽微．假令純陰結不得復有外證．悉入在裏．此爲半在裏半在外也．脈雖沉緊．不得爲少陰病．所以然者．陰不得有汗．今頭汗出．故知非少陰也．小柴胡湯主之．（正二十九）○傷寒五六日已汗下．胸脇滿．微結．小便不利．渴而不嘔．但頭汗出．往來寒熱．心煩者．此表未解也．柴胡桂枝乾薑湯主之．（正方三十二）病人但頭汗出．身無汗．劑頸而還．小便不利．渴引水漿者．此爲瘀熱在裏．身必發黃．五苓散．（正六十六）茵蔯湯．（正方九十三）○陽明病下之．其外有熱．手足溫．不結胸．心中懊憹．飢不能食．但頭汗出者．梔子豉湯

主之、（正四十五）○心下緊滿。無大熱。頭汗出者。（茯苓湯主之。雜八十四）仲景云。傷寒心下緊滿。無大熱。但頭汗出者。此名爲水結在胸脇。以頭汗出別水結證。小半夏加茯苓湯。雜方八十二）○陽明病下血讝語者。爲熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其實而瀉之。汗出則愈。過經乃可下也。下之早。語言必亂。以表實裏虛故也。

（六十八）問頭疼

頭疼者。陽證也。太陽證頭疼。必發熱惡寒。無汗者。麻黃湯。（正方二十）有汗者。桂枝湯。若已發汗。或未發汗。頭痛如破者。連鬚葱白湯。（雜七十五）服湯不止者。葛根葱白湯主之。（雜七十六）脈弦細頭痛發熱者。屬少陽也。少陽不可發汗。小柴胡主之。（正二十九）陽明證頭疼不惡寒。反惡熱。胃實故也。陽明氣實。故攻頭也。調胃承氣湯。（正四十三）主之。（仲景云。傷寒不大便。六七日頭疼有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。續在表也。當須發汗。若頭疼者必衄。屬桂枝湯。（正方一）太陰少陰經從足至胸。俱不至頭。唯厥陰經挾胃。屬肝絡膽。循喉嚨上頗顙。連目出額。故太陰少陰並無頭疼之證。仲景只有厥陰一證。吳茱萸湯。（正方一百）治乾嘔吐涎沫。頭疼而已。大抵屬三陽者。頭疼爲多也。（孫眞人云。陽傷寒者。體熱頭疼是也。陰傷寒者。不壯熱不頭痛是也。）若非次頭疼。胸中滿。及發寒熱。脈緊而不大者。卽是膈上有涎。宜用瓜蒂末一錢。暖水調下。吐涎立愈。○又問病人頭疼鼻塞而煩者。何證也。此屬濕家。頭中寒濕。故鼻塞而頭疼也。（內瓜蒂末鼻中。則愈。法在發黃門中。）

（六十九）問身體痛（身痒附）

太陽少陰厥陰皆有身體痛。當以外證與脈別之。太陽證表未解。脈浮緊。法當身體痛。宜麻黃湯。（正方二

十）以汗之。脈浮緊，當身體疼痛，宜以汗解，假令尺脈遲者，不可發汗，何以知其然，榮氣不足，血少故也，尺脈遲者，先以小建中湯以養之，（正三十七）脈浮者，麻黃湯主之。太陽中濕，一身盡痛，發熱身黃，小便不利，病人中濕，因而傷風，風濕相薄，一身痛重，是名風濕，當於風濕中求之，（麻黃加朮湯主之，雜方一百二十二）若脈沉自利而身體痛者，陰證也，急當救裏，宜四逆湯，（正七十五）附子湯，（正六十八）眞武湯（一百五）之類以溫之。（大抵大便利而身體疼者，當救裏，大便如常而身體痛者，急當救表，此不可不知也。）或身重背強，腹中絞痛，咽喉不利，身如被杖者，當作陰毒治之。○又問發汗後身疼痛，脈沉而遲，當用何藥，仲景有桂枝加芍藥生薑人參新加湯，（正方十一）蓋爲此證也。小建中湯，（正三十七）兼治汗後身疼，脈沉而遲者，若霍亂吐瀉止而身疼痛不休者，少與桂枝湯，（正方一）即愈，金匱要略云，病家雖身體痛，不可發汗，汗出則痙。○又問身痒者，何也，脈浮而遲，遲爲無陽，不能作汗，其身必痒，太陽病七八日，脈微而惡寒，以陰陽俱虛，不可更發汗，更下，更吐也，（小柴胡湯主之，正二十九，若重反發汗，則氣虛，必兩耳聾無聞，素無熱人，可芍藥甘草附子湯，正七十二，素有熱人，可黃耆建中湯，正三十七）面赤有熱者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必當痒，宜桂枝麻黃各半湯。（正方二）

（七十）問筋惕肉瞤，頭眩身搖。

太陽病發汗不解，發熱心悸，頭眩，身瞤動，欲擗地者，屬眞武湯，（正一百五）大凡發汗過多，即身瞤動，振搖，虛羸之人，微發汗，便有此證，俱宜服眞武湯，羸甚者，去芍藥，或少用之，有熱證惡熱藥者，去附子，餘依本方加減法詳之。○傷寒若吐若下後，心下逆滿，氣上衝胸，起則頭眩，脈沉緊，發汗則動經，身爲振搖者，茯苓桂枝白朮甘草湯主之，（正方五十二）○傷寒應發汗而動氣在左，不可發汗，發汗則頭眩，汗出，筋惕肉

瞤。此爲逆難治。且先服防風白朮牡蠣散。（雜方二）次服建中湯。（正三十七）

（七十一）問喘

傷寒喘。只有太陽陽明二證。○太陽病頭疼發熱。身疼惡風。無汗而喘者。宜汗。屬麻黃湯。（正方二十）桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃芩黃連湯也。（正二十八）太陽病下之微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏子湯也。（正方十九）發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏子甘草石膏湯也。（正方三十一）○陽明病。汗出不惡寒。腹滿而喘。有潮熱者。宜下。屬承氣湯。（正四十二）然陽明病。脈浮無汗而喘。發汗則愈。宜麻黃湯。（正方二十）○太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯。○又發汗後。飲水多。欬而微喘者。水停心下。腎氣乘心故也。小青龍去麻黃加杏仁。（正三十六）○小腹滿者。去麻黃加茯苓也。（正二十六）又問麻黃主喘。何故去之。此治心下有水而喘。不留汗也。小便不利。小腹滿。故去麻黃加茯苓也。

（七十二）問渴

脈浮而渴。屬太陽。傷寒表不解。心下有水氣而渴者。小青龍去半夏加栝樓根。（正三十六）太陽病。服桂枝大汗出後。大煩渴者。白虎加人參。（正六十五）脈浮小便不利。微熱消渴者。五苓散。（正六十六）傷寒四五日。身熱惡風。脊下滿。手足溫而渴者。小柴胡去半夏加人參栝樓根主之。（正二十九）太陽證身體灼熱而渴者。乍風溫。栝樓根湯主之。（雜方四十七）有汗而渴。屬陽明。主之。虛人老人。及春秋月可與竹葉石膏湯。（正九十五）陽明病。但頭汗出。小便不利。渴引水漿。身必發黃。宜茵蔯湯。（正九十三）小柴胡去半夏加人參栝樓根。（正二十九）傷風寒熱。或發熱惡風而渴。屬少陽。少陽脅下韌。不大便而嘔。舌上白胎而渴。小柴胡去半夏加人參栝樓湯。（正二十九）自利而渴。屬少陰。傷寒熱入於臟。流於少陰之經。少陰主腎。腎惡燥。故渴而引飲。少陰下利。欬而嘔渴。猪苓湯主之。（正六十七）下利欲飲水。○切戒太陽證無汗而渴者。不可與白虎湯。仲景云。渴欲飲水無者。以有熱也。白頭翁湯主之。（正方一百八）不可與白虎湯。薏苡小青龍去半夏加栝樓也。（正方三十六）湯。脈浮發熱無汗。是表未解也。不可與白虎湯。傷寒四五日身熱惡風。脅下滿。手足溫而渴者。小柴胡去半夏加人參栝樓也。（正二十九）陽明證汗多而渴者。

不可與五苓散。汗多胃中燥。猪苓復利其小便故也。薏苡竹葉湯可與之。仲景云。陽明病發作有時。汗出多者。急下也。太陽病渴。終不可與白虎耶。太陽證得汗後。脈洪大而渴者。方可與之也。陽明病渴。終不可與五苓耶。陽明證小便不利。汗少脈浮而渴者。方可與之。此皆仲景之妙法也。仲景猪苓湯證。亦云脈浮發熱渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯與之。（正六十七）○凡病非大渴不可與水。若小渴咽乾者。只小呷滋潤之。令胃中和。若大渴煩躁甚。能飲一斗者。與五升飲之。若全不與。則乾燥無由作汗。發喘而死。常人見因渴飲水得汗。小渴遂劇飲之。致停飲心下。滿結喘死者甚衆。當以五苓散（正六十六）或陷胸丸（正三十九）與之。金匱要略云。得時氣至五六日而欲欲飲水不得多不當與也。何者。以腹中熱尚少。不能消之。便更爲人病矣。至七八日大渴欲飲水。猶當依證與之。常令不足。勿極意也。凡人但見仲景云。得病反能飲水。此爲欲愈。遂小渴者。乃強飲之。因成其禍。不可勝數。大抵傷寒水氣皆因飲水過多所致。水停心下。氣上乘心。則爲悸爲喘。結於胸脇。則爲水結胷。胃中虛冷。則爲嘔爲噦。冷氣相薄則爲噎。上迫於肺則爲咳。漬入腸中。則爲利。邪熱所薄畜於下焦則爲小便不利。小便滿。或裏急。溢於皮膚則爲腫。○若陽毒倍常躁盛大渴者。黑奴丸主之。（雜方二十）○中暑伏熱深累取不差。其人發渴不已。酒蒸黃連丸主之。（雜七十九）

（七十二）　問鼻衄

傷寒太陽證。衄血者乃解。蓋陽氣重故也。仲景所謂陽盛則衄。若脈浮緊無汗。服麻黃湯。（正方二十）不中病。其人發煩目瞑。劇者必衄。小衄而脈尚浮緊者。宜再與麻黃湯也。衄後脈已微者。不可行麻黃湯也。若脈浮自汗。服桂枝湯（正七）不中病。桂枝證尚在。必頭疼甚而致衄。小衄而脈尚浮者。宜再與桂枝也。衄後脈已微者。不可行桂枝湯也。大抵傷寒衄血不可發汗者。爲脈微故也。治法。衄家不可發汗。汗出額上陷。脈緊急。直視不能瞬。不得眠。然而無汗而衄。脈尚浮緊者。須再與麻黃湯。有汗而衄。脈尚浮緩者。須再與桂枝湯。脈已微者。黃芩芍藥湯。（雜七十八）犀角地黃湯。（雜八十六）

衄血不止者茅花湯（雜方八十）若衄而渴心煩飲則吐水先服五苓散（正方六六）次服竹葉湯（正九十五）〇又問陰證有衄血者乎陰證自無熱何緣有衄若少陰病但厥無汗強發之必動血未知從何道出或從口鼻或從耳目是謂下厥上竭爲難治

（七十四）問腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語遺尿此三陽經合病也白虎湯主之（正六十四）不可發汗汗之則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者白虎加人參也（正六十五）又第二問論合病

類證活人書卷第十

此一卷首論結胸與痞。蓋病發於陽。下之早。卽爲結胸。發於陰。下之早。卽爲痞。然結胸與痞相似。但以痛不痛爲異耳。心下滿而硬痛者爲結胸。但按之滿不痛者爲痞。醫家不審。一有差互。立致危殆。結胸屬陷胸證。痞屬瀉心證。其詳各於逐問備論之矣。

（七十五）問心下緊滿。按之石硬而痛。

此名結胸也。傷寒本無結胸。應身熱下之早。熱氣乘虛而入。痞結不散。便成結胸。若已誤轉了初未成結胸者。急頓與理中湯服。（正七十四）自然解了。更不作結胸。蓋理中治中焦故也。此古人亦議不到。後因人消息得之。若大段轉拽有厥證者。兼與四逆湯。（正七十五）便安。胃中雖和。傷寒未退者。卽候日數足。可下。却以承氣再下之。（正四十二）蓋前來下得未是故也。其證心下緊滿。按之石硬而痛。項強如柔痓狀。發熱汗出不惡寒。名曰柔痓。其脈寸口浮。關尺皆沉。或沉緊。名曰結胸也。治結胸。大率當下。仲景云。下之則和。然脈浮與大。皆不可下。下之則死。尙宜發汗也。仲景云。結胸脈浮者。不可下。只可用小陷胸湯。（正方四十）大抵脈浮。是尙有表證。兼以小柴胡湯等。（正二十九）先發表。表證罷。方用下結胸藥便安。○西晉崔行功云。傷寒結胸。欲絕。心臍高起。手不得近。用大陷胸湯。（正三十八）皆不差者。此是下後虛逆。氣已不理。而毒復上攻。氣毒相薄。結於胸中。當用枳實理中圓。（雜八十一）先理其氣。次療諸疾。古今用之如神。應手而愈。○然結胸有三種。有大結胸。不按而痛。胸連臍腹堅硬。爲大結胸。大陷胸丸主之。（正三十九）有小結胸。按之心下痛。爲小結胸。小陷胸湯主之。（正四十）有水結在胸脇間。亦名結胸。頭微汗出。但結胸無大熱。此水結在胸脇。而痛證。小半夏加茯苓湯。（雜八十二）小柴胡去黍加牡蠣主之。（正二十九）○又有寒熱二證。有熱實結胸。胸中煩躁。心內懊憹。舌上燥渴。脈沉滑者。皆熱證也。大陷胸湯主之。（正三十八）

有寒實結胸。寒實結胸・無熱證者・三物白散・（正入十八）實理中丸主之・（雜方八十一）近世治結胸。多行金鍼丸。用硫黃陽起石者。若寒實結胸行之或有差者。若熱實結胸行之必死也。○又問大陷胸湯與大陷胸丸如何。大陷胸湯甘遂太峻。不可輕用。須量虛實輕重。不得已。卽大陷胸丸最穩。○又問聖餅子灸臍中如何。此尤不可用也。○又云。臟結無陽證。不往來寒熱。其人反靜舌上胎滑者。不可攻也。二者病人脇下舊有痞。連在臍傍痛。引小腹入陰筋者。亦名臟結。死不治。○又問臟結者何也。臟結者死。仲景無治法。大抵臟結。其證如結胸狀。飲食如故。時時下利。陽脈浮。關脈小細沉緊。名曰臟結。舌上白胎滑者。難治也。

（七十六）　問心下滿而不痛

此名痞也。傷寒本無痞。應身冷。醫反下之。遂成痞。枳實理中丸（雜八十一）最良。仲景治痞氣・諸湯中有生薑瀉心湯・（正六十三）此湯藥味・蓋本理中人參黃芩湯方也・審牛夏瀉心湯（正六十一）仲景云。滿而不痛者爲痞。柴胡不中與也。半夏瀉心湯主之。此二方平和・宜常用之・審知是痞。先用枳梗枳殼湯尤妙。（雜八十三）緣枳梗枳殼。行氣下膈。先用之。無不驗也。結胸與痞關脈須皆沉。○若關脈浮者。大黃黃連黃芩瀉心湯（正方五九）主之。關浮則結熱・三黃以瀉肝・○若復惡寒汗出者。附子瀉心湯（正方六十）主之。○病人心下痞。與瀉心湯。痞不解。發渴口燥煩。小便不利者。五苓散（正六十六）主之。○汗出表解而胃中不和。心下痞鞕。乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴。下利者。生薑瀉心湯主之。（正六十三）○下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞕而滿。此以醫下之也。若復下之。其痞益甚。甘草瀉心湯主之。（正六十二）蓋此非結熱。以胃中虛。客氣上逆。故使鞕也。○下利而心下痞。服生薑瀉心湯。甘

草瀉心湯、利不止者、當治其下焦、赤石脂禹餘糧湯主之、（正一百九）蓋生薑瀉心、甘草瀉心、皆治中焦、此利在下焦、若只治中焦、則利益甚耳、服赤石脂禹餘糧湯、利復不止、當利其小便、五苓散主之、○凡痞服瀉心湯不愈、然後可用陷胸丸（正三十九）下之、（不可用陷胸湯、蓋太猛、只用陷胸丸、）○大抵結胸與痞、皆應下、然表未解者、不可攻也、仲景云、當先解表、表解乃可攻痞、解表宜桂枝湯、（正方一）攻痞宜大黃黃連瀉心湯、（正五十九）外證未解、心下妨悶者、非痞也、謂之支結、柴胡桂枝湯主之、（正三十一）胸脇滿微結、小柴胡湯加乾薑牡蠣湯主之、（正二十九）○若太陽證未除而數下之、遂協熱而利、利不止、心下痞鞕表裏不解者、桂枝人參湯主之、（正方十六）十棗湯、（正八十九）大柴胡湯、（正三十）皆治心下痞、此方尤難用、須是表證罷、不惡寒、身涼、其人漐漐汗出、發作有時、頭疼、心下痞鞕滿、引脇下疼、乾嘔、短氣者、乃可行十棗湯、表未解者、愼不可用也、大柴胡湯、治傷寒發熱汗出不解、心下痞鞕、嘔吐而下利者、非大柴胡湯不可也、（正方三十）○若發汗吐下後、心下痞鞕、噫氣不除者、旋復代赭湯主之、（正方一百十）○有旋復代赭湯證、其人或欬逆氣虛者、先服四逆湯、（正七十五）胃寒者、先服理中丸、（正七十四）次服旋復代赭湯爲良、（旋復花代赭湯、是解後心下痞鞕證、）

（七十七）問嘔者乾嘔附

無陽則厥、無陰則嘔、嘔者足陽明胃之經、足陽明之氣下行、今厥而上行、故爲氣逆、氣逆則嘔、仲景云、嘔多雖不大便、不可下、可與小柴胡湯、（正二十九）上焦得通、津液得下、胃氣因和、涘然汗出而解、大抵嘔證不一、各有治法、要之小柴胡湯、尤相主當耳、與小柴胡湯、胸脇滿而嘔、日晡發潮熱者、可小柴胡湯加

芒硝也。（正方三十四）若嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。與大柴胡湯也。（正方三十）大便祕。老方加大黃。大柴胡治嘔最妙。爲內有枳實故也。枳實去穢壓虛氣。須是去大黃。仲景云。嘔多雖有陽明。愼不可下。官局桔梗湯最良。亦用枳實耳。方具第十七卷中。古人治嘔。多用半夏生薑。孫眞人云。生薑是嘔家聖藥。仲景治嘔。皆用之。（太陽與陽明合病。必下利。若不和但嘔者。葛根加半夏生薑湯主之。（正二十七）胸中有熱。胃中有邪氣。腹痛欲嘔者。黃連湯主之。（正八十三）太陽與少陽合病而自利。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。（正八十六）金匱諸嘔吐。穀不得下者。小半夏湯、小半夏加茯苓湯。（雜八十二）小半夏加橘皮湯。皆可選用也。嘔而發熱者。小柴胡湯主之。（正二十九）嘔而發渴者。猪苓湯主之。（正六十七）先嘔却渴者。此爲欲解。急與之。先渴却嘔者。爲水停心下。此屬飲家。仲景云。本渴飲水而嘔者。柴胡不中與也。宜治膈間有水。赤茯苓湯主之。（雜八十四）若少陰證而嘔者。眞武湯去附子加生薑也。（正一百五）若汗若吐若下後。虛煩不得眠。若嘔者。梔子生薑湯（正四十七）主之。傷寒差後嘔者。有餘熱在胃脘。竹葉湯加生薑主之。（正九十五）○又問有乾嘔者何也。大凡嘔者。飲食不下。乾嘔者。今人所謂惡也。或因汗出。或因有水。或因下利。脾胃有熱。故使乾嘔。官局中桔梗湯最佳。（雜方一百二十一）仲景治法。汗自出乾嘔者。桂枝證也。（正方一）表不解。心下有水氣。乾嘔發熱者。小青龍也。（正三十六）身涼汗出。兩脇痛。或乾嘔者。十棗湯也。（正八十九）少陰下利脈微。與白通湯。（正方九十八）利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加猪膽汁湯也。（正九十八）少陰下利。裏寒外熱。脈乾欲絕。或乾嘔者。通脈四逆湯也。（正八十一）乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯也。（正方一百）傷寒詩云。食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。屬上焦也。仲景無治法。大抵吳茱湯治少陰證也。穀入胃而嘔。屬陽明。官與小柴胡湯。（正二十九）○若病人直患嘔吐而復脚弱或疼。乃是脚氣。當作脚氣治之。法在第七卷五十四問。

（七十八）　問吐

吐有冷熱二證。寸口脈數。手心熱。煩渴而吐。以有熱在胃脘。五苓散主之。（正六十六）傷寒有表證。渴欲飲水也。水入口即吐者。名曰水逆。由心經受熱而小腸不利故也。宜服五苓散。發汗後。水藥不得入口爲逆。若更發汗。必吐下不止。小半夏加茯苓湯。大半夏加橘皮湯主之。曾經汗下。關脈遲。胃中虛冷而吐。乾薑黃芩黃連人參湯主之。（正方一百七）寒多不飲水而吐者。理中湯去朮加生薑主之。（正七十四）少陰病飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之手足寒。脈弦遲者。此胸中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐也。當溫之。宜四逆湯。（正方七五）吐利手足逆冷煩躁甚者。吳茱萸湯主之。（正方一百）若傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯主之。（正方九十五）

（七十九）　問嘔吐而利

嘔吐而下利有兩證。仲景云。傷寒發熱汗出不解。心中痞硬。嘔吐而下利者。大柴胡湯下之。（正方三十）又有霍亂證。霍亂嘔吐而利。熱多而渴者。五苓散。（正方六十六）寒多不飲水者。理中丸。（正七十四）或有寒。腹滿痛。或四支拘急。下利。脚轉筋。理中湯加附子一枚生用。並粗末作湯服之。（正方七十四）　吐利汗出發熱惡寒。四支拘急。手足厥冷者。四逆湯主之。（正七十五）少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死。吳茱萸湯主之。（正方一百）吐利止而身體痛不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯。（正方一）仲景大柴胡一證云。傷寒發熱汗出不解。心中痞。嘔吐而下利者。大柴胡主之。即非霍亂也。吐利已汗出而厥。四支拘急不解。脈微欲絕者。通脈四逆加猪膽湯。（正八十二）若夏月中暑霍亂。上吐下利。心腹撮痛。大渴煩躁。四支逆冷。冷汗自出。兩脚轉筋。宜服香薷散。（雜八十五）須井中沉令極冷。頓服之乃効。香薷散。夏月須宜合下。以備此證。其他藥不能救。仍須極

冷併服之。

（八十）　問咳嗽

傷寒咳嗽有兩證。有太陽證咳嗽。小青龍、（正三十六）小柴胡也。（正二十九）有少陰證咳嗽。眞武湯、（正一百五）四逆散、（正七十六）猪苓湯也。（正六十七）大抵熱在上焦。其人必飲水。水停心下。則肺爲之浮。肺主於咳。水氣乘之。故咳而微喘。○仲景云。傷寒表不解。心下有水。乾嘔發熱而咳。小青龍湯主之。（小便不利。小腹滿者。去麻黃加茯苓。）往來寒熱。胸脇滿痛。或咳者。小柴胡湯主之。（小柴胡去人參大棗。加五味子乾薑。）若少陰證咳嗽。四支沉重疼痛。小便不利。自下利而咳。眞武湯主之。（眞武湯加五味子乾薑。）大抵傷寒水氣。皆因飲水過多。古人治水氣而咳者。病在陽。則小青龍湯主之。病在陰。則眞武湯主之。四支厥逆。腹中痛。或泄利而咳。四逆散主之。（四逆散加五味子乾薑。）下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠。猪苓湯主之。○古今錄驗橘皮湯治嗽佳。（雜方一百二十四）

（八十一）　問咽喉痛

咽喉痛有陰陽二證。脈浮數。面赤班班如錦文。咽喉痛。唾膿血者。此陽毒也。（在第四卷中二十一問。）脈沉遲。手足厥冷。或吐利而咽中痛。此少陰證也。病源云。此爲下部脈都不至。陰陽隔絕。邪客於足少陰之絡。毒氣上衝。故咽喉不利。或痛而生瘡也。傷寒脈陰陽俱緊。及汗出者亡陽也。此屬少陰。法當咽痛而復吐利。此候汗下熏熨俱不可。汗出者藥本粉傅之。咽喉痛者甘草湯、（正五十四）桔梗湯、（正方一百二）猪膚湯、（正方一百一）半夏散、（正方一百三）通脈四逆去芍藥加桔梗湯、（正方八十一）麻黃升麻湯、（正二十五）可

選而用之。○又有伏氣之病。謂非時有暴寒中人。伏氣於少陰經。始不覺病。旬月乃發。脈微弱。法先咽痛。似傷寒。非喉痹之病。次必下利。始用半夏桂甘草（雜五十三）次四逆散主之（正七十六）此病只一二日便差。古方謂之腎傷寒也。

（八十二）問口燥咽乾

脾臟有熱。則津液枯少。故令口燥而舌乾。仲景云。傷寒無大熱。口燥渴而煩。背微寒者。白虎湯加人參也。（正六十五）又云。陽明病渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。○若咽乾者。愼不可發汗。發汗則重亡津液。少陽證口苦咽乾者。小柴胡主之。（正二十九）少陰證。口燥咽乾者。急下之。病人默默欲眠。目不能開。起居不安。其聲嗄。或咽乾者。當作狐惑治之。（狐惑證在第十一卷九十九問。）

（八十三）問病人但漱水不欲嚥

陽明證。頭疼身熱。口燥。但漱水不欲入咽者。必衄也。若病人無表證。不發寒熱。胸腹滿脣燥。但欲漱水不欲嚥者。此爲有瘀血。必發狂也。輕者犀角地黃湯（雜八六）甚者抵當湯（正九十一）

（八十四）問不欲眠

太陽證發汗。大汗出。胃中乾。煩燥不得眠。欲飲水者。當少少與之。胃中和。卽愈。若脈浮。小便不利。發渴者。五苓散（正六十六）主之。下後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沉微。身無大熱者。乾薑附子湯主之。（正七十三）若發汗。若吐。若下後。虛煩不得眠。劇則反覆顛倒。心中懊憹者。宜梔子

豉湯（正四十五）吐之。梔子豉湯一盞半爲一劑，分再服一服得吐止後服。傷寒大熱。乾嘔呻吟錯語。不得眠。黃連解毒湯主之。（雜八十七）傷寒吐下後。心煩乏氣。晝夜不得眠。酸棗湯主之。（雜八十八）少陰病得之二三日已上。心中煩不得眠。黃連阿膠湯主之。（雜一百四）若少陰病下利而渴。不得眠。豬苓湯主之。（正六十七）○又問傷寒差後不得眠。何也。蓋熱氣與諸陽相并。陰氣未復。所以病後仍不得睡也。梔子烏梅湯主之。（雜八十九）

（八十五）問多眠

多眠有四證。有風溫證。有小柴胡證。有少陰證。有狐惑證。○病人尺寸脈俱浮。頭疼身熱。常自汗出。體重。其息必喘。四支不收。默默但欲眠者。風溫證也。風溫不可發汗。宜萎蕤湯。（雜四十五）在第六卷中第四十五問。○病人脈浮頭項強痛而惡寒者。太陽證也。十日已去。脈浮細而嗜臥者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。（正二十九）脈但浮者。麻黃湯主之。（正二十）病人尺寸脈俱沉細。但欲寐者。少陰證也。急作四逆湯。（正七十五）復其陽。不可緩也。○若狀如傷寒。四支沉重。忽忽喜眠。須看上下脣。上脣有瘡。蟲蝕五臟。下脣有瘡。蟲蝕下部。當作狐惑治之。在第十一卷中第九十九問。

（八十六）問身涼汗出兩脇疼痛或乾嘔

此十棗湯證也。仲景云。太陽中風。下利嘔逆。表解者乃可攻之。其人漐漐汗出。發作有時。頭痛心中痞鞕。滿引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。十棗湯主之。（正八十九）○大抵脇下痛者。此爲有飲。須分表裏。乾嘔微利發熱而咳。爲表有水。小青龍湯加薤花主之。（正三十六）身體涼。表證罷。乾嘔而脇下痛。爲裏有水。十棗湯主之。十棗湯非小青龍湯之比。須量人虛實。不可妄投。

類證活人書卷第十一

此一卷首論咳逆傷寒咳逆此證極惡仲景經中不載孫眞人云咳逆遍尋方論無此名稱深窮其狀咳逆者噦逆之名蓋古人以咳逆爲噦耳大抵咳逆者古人所謂噦是也惋者今人所謂乾嘔是也

（八十七）　問咳逆

咳逆者仲景所謂噦者是也（乙芮切逆氣）噦胃寒所生傷寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛復發汗者其人外怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒故也橘皮乾薑湯（雜方九十）羌活附子散（雜九一）半夏生薑湯（雜九十二）退陰散主之（雜方十四）若服藥不差者灸之必愈（其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指爲率正以男左女右艾炷如小豆許與乳相直間陷中動脈處是）然亦有陽證咳逆者小柴胡湯（正二十九）橘皮竹茹湯（雜方五）仲景又云傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之卽愈（仲景無方前部宜猪苓湯（正六十七）後部宜調胃承氣湯（正四十三）○扁鵲中藏經治傷寒咳逆丁香散丁香梯蒂各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱猛嗅極効○三因第十一卷又有竹茹湯等方亦丁香散方竹茹湯治陽證也○本事方第八卷治傷寒候咳逆豆蔻湯治陰證咳逆丁香茴香肉豆蔻等藥若陽證不可用○凡咳逆多有先熱而喫生冷或涼藥多相激而成蓋陰陽二氣相搏林人之僕本發大熱以涼藥下之想大甚咳逆四五日竟至於服丁香梯蒂而后却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下后蓋有身熱不解○治傷寒咳逆後二方出撫州華蓋山周

先生惟一備急方救急方香附子、橘核各半兩細剉用酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒藥燋黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細旋呷服○一方單用香附子末○又方大蒜頭二箇煨動研爆入白薑末（丸得爲度）研和如梧桐子大搗薤菜自然汁吞下二十圓病退再服一十五圓

（八十八）　問發黃

病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃（漢贊南方暑濕近夏瘴熱蓋瘴者黃也古人以黃爲瘴濕熱相薄民多病瘴甚爲酘胎也）然發黃與瘀血外證及脈俱相似但小便不利爲黃小便自利爲瘀血要之發黃之人心脾蘊積發熱引飲脈必浮滑而緊數若瘀血證卽如狂大便必黑此爲異耳凡病人身體發熱頭面汗出身無汗劑頸而止渴引水漿小便不利如此必發黃茵蔯蒿湯（正九十三）加五苓散（正六十六）也（茵蔯蒿湯十分五苓散五分三件拌和每服一錢溫水調下日三服）病人服湯得小便利如皂莢汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治濕不利小便非其治也（大抵發黃者瘀熱在裏由小便不利而致之也）梔子蘗皮湯（正方五十）麻黃連翹赤小豆湯（正二十四）可選而用之又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻中出黃水甚驗卽用茵蔯蒿湯調五苓散服之最良○又問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃答曰白虎與發黃證相近遍身汗出此爲熱越白虎證也頭面汗出頸以下都無汗發黃證也○又問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之（第九卷六十九問）○又問病人脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不

得汗嗜臥一身及目悉黃小便難有潮熱時時咳嗽者何也少陽中風也小柴胡湯主之（正方二十九）

（八十九）問發狂

發狂有二證陽毒發狂畜血如狂其外證與脈皆不同病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脈實潮熱獨語如見鬼狀此陽毒也二十一問病人無表證不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈微而沉小腹鞕滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也（治藥方在病人如熱狀煩滿口燥其脈反無熱此爲陰伏其血證審矣仲景云太陽病不解熱結膀胱其人如狂其血自下者愈若外不解者尙未可攻當先解其表且桂枝湯（正方一）外已解但小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之（正四十四）大抵傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化爲血其人善忘而如狂血上逆則善忘血下畜則內爭甚者抵當湯（正九十一）抵當圓（正方九十）輕者桃仁承氣湯（正四十四）犀角地黃湯（雜八十六）須取盡黑物爲効（夫血熱畜在膀胱經若用抵當湯更須仔細審其有無表證若有畜血證而外不解亦未可便用抵當湯先用桂枝湯以解其外緣熱在膀胱太陽經故也）○又有火邪發驚狂者醫以火於臥牀下或周身用火迫刼汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂臥起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯（正方十）桂枝甘草龍骨牡蠣湯（正方十四）主之（凡灸及燒鍼後證似火劫者並用刼法治之金匱風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯更捷正三十三）

（九十）問發斑

發斑有兩證（溫病發斑熱病發斑）溫毒發斑者冬月觸冒寒毒至春始發或已汗下表證未除毒氣未解故發斑黑膏主之（雜九十三）或冬月溫暖人感乖戾之氣至春初爲積寒所折毒氣未得泄迫天氣暄暖溫毒始發肌肉斑爛癥疹如錦紋而咳心悶嘔清汁葛根橘皮湯（雜九十四）屢用之驗黃連橘皮湯亦佳（雜一

百二十五）廣州褚倖子斑如壞梨醬熱病發斑者與時氣發斑同或未汗下或已汗下熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚遂發斑瘡瘢疹如錦紋俗呼瘡麩素問謂之胗（發斑者下之太早熱氣乘虛故也下之太遲熱留胃中亦發斑服熱藥過多亦發斑微者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生）大抵發斑不可用表藥表虛裏實若發汗開泄更增斑爛也皆當用化斑湯（雜百二十）玄參升麻湯（雜九十五）阿膠大青湯（雜九十六）猪膽梔子湯（雜四十四）或與紫雪大妙可下者與調胃承氣湯（正四十三）暑月陽氣重者常宜體候才有赤點如蚊蚤咬即急治之○又有陽毒發斑見十九問二十一問宜參酌之

（九十一）問讝語

病人有讝語有鄭聲二證鄭聲爲虛當用温藥白通湯主之（正九十七）讝語爲實當須調胃承氣湯主之（正四十三）服調胃承氣而讝語止或更衣者停後服不爾再與之仲景云實則讝語虛則鄭聲鄭重也重語也世多不別然讝語鄭聲亦相似難辨須更用外證與脈別之若大小便利手足冷脈微細者必鄭聲也大便祕小便赤手足温脈洪數者必讝語也以此相參然後用藥萬全矣大抵傷寒不應發汗即讝語（仲景云傷寒四五日脈沈而喘滿沈爲在裏反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實實則讝語）讝語屬胃和中則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯然亦有三陽合病讝語者（三陽合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢讝語遺溺其脈必滑實不可汗下宜白虎湯（正六十四））有胃實讝語者（病人身熱汗出大便硬爲胃實宜調胃承氣湯（正四十三）大承氣（正四十一）外臺承氣湯無芒硝尤穩）或發汗多亡陽讝語者（仲景云發汗多亡陽讝語者不可下此爲津液自愈恐人作燥屎攻之愼不可攻也）有不利讝語者（不利讝語有燥屎也調胃承氣湯（正方四十三））有下後讝語者（下之胸滿煩驚小便不利讝語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯（正三十三））有婦人熱入血室讝語者（婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讝語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二

焦．速用小柴胡湯主之．（正二十九）若行湯遲．熱入胃．令津燥．中焦上焦不榮．成血結胸狀．須當針期門也．婦人中風．發熱惡寒．經水適來．入血室也．當刺期門．隨其實而取之．已上二焦．熱結在期門也．若犯胃氣．晝夜譫語．喜忘．小腹滿．小便利．屬抵當湯證中．（正九十一）○又問仲景云無犯胃氣何也答曰熱因經水適來乘虛入室故血室有熱遂令譫語當以小柴胡解之．（正二十九）却與胃實譫語不同胃實有燥糞故宜調胃承氣湯下之．（正四十三）若血實有熱譫語非胃家實仲景恐人作胃實攻之故曰無犯胃氣也大抵譫語是熱屬陽而反見陰證者逆．

（九十二）問吐血

傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不發汗熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當圓．（正方九十）輕者桃仁承氣湯．（正四十四）兼服犀角地黃湯．（雜八十六）三黃圓．（雜九十八）

（九十三）問腹痛腹脹滿附

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛是有表復有裏仲景所以用桂枝加芍藥湯主之．（正方十二）痛甚者加大黃．（正方十三）桂枝加芍藥．即是小建中也．太陰脈弱自利．設當行大黃芍藥者宜減之．其人胃虛．陽氣易動故也．下利者．先煎芍藥十餘沸．難經云痛爲實．大抵痛宜下．仲景云．發汗不解．腹滿痛者急下之．宜大承氣湯．（正四十一）又曰腹中滿痛．此爲實．當下之．屬大柴胡湯．（正方三十）腹痛有二證有熱痛有冷痛尺脈弦腸鳴泄利而痛者冷痛也小建中湯主之．（正三十七）仲景云陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯．小柴胡去黃芩加芍藥．（正方二十九）陰證腹痛．即四逆散．（正七十六）通脈四逆加芍藥湯．（正八十一）腹痛小便不利者．眞武湯．（正一百五）關脈實腹滿大便祕．按之而痛者．實痛也桂枝加大黃湯．（正方十三）

黃連湯、（正八十三）大承氣湯主之。（正四十一）○又問腹脹滿者何也。陰陽不和也。桔梗半夏湯最良。（雜九十九）仲景論太陽證發汗後腹脹滿也。厚朴生薑半夏甘草人參湯。（正五十八）下後心煩腹滿。臥起不安者。梔子厚朴湯。（正四十八）吐後腹脹滿者。與調胃承氣湯。（正四十三）少陰病六七日腹脹不大便者。急下之。宜承氣湯。（正四十三）

（九十四）問煩躁

傷寒煩躁。太陽與少陰經爲多。蓋太陽與少陰爲表裏。陽明經或因不大便。中有燥屎。故煩躁耳。仲景云。病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁。發作有時者。此有燥屎也。宜承氣湯。大抵得病二三日。脉弱無太陽柴胡證。煩躁。心下鞕。小便利。屎定鞕。以小承氣湯。（正四十二）少少與。微利之。然有病已差。尚微煩。必大便鞕。當問其小便日幾行。若小便少。津液當還入胃。不須攻也。大抵陰氣少。陽氣勝。則熱而煩。故太陽經傷風。多煩而躁也。仲景云。太陽傷風。不解。先刺風池風府。却與桂枝湯。（正一）煩太陽傷風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。無汗而煩躁者。大青龍湯主之。（正三十五）又云。傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。（正三十七）又云。傷風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐。五苓散主之。（正六十六）又云。傷寒得病無熱。但狂言。煩躁不安。精氣不與人相當。但與五苓散。二大錢服之。當與新汲井水飲一升許。卽以指刺喉去之。隨手愈。然而太陽證自汗。心煩。若心悸數者。又不可用桂枝表也。陽虛陰盛亦發煩躁。陽氣弱爲陰所乘而躁。故少陰病亦煩躁。少陰病二三日已上。心煩不得臥。黃連阿膠湯主之。（正八十四）少陰病吐利手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。（正方一百一）少陰病下利。胸痛心煩者。猪膚湯主之。（正一百一）少陰下利。六七日欬而嘔。渴煩不得眠。猪苓湯主之。（正六十七）少陰病惡寒而蹈。時時自煩。欲去衣被。大柴胡湯下之。（正方三十）學者當以外證與脉別之。寸關浮數。身熱而煩者。屬太陽也。尺寸俱沉。手足厥逆。自利而煩者。屬少陰也。然有汗之而煩者。仲景云。太陽病發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。少少與之。令胃中和。卽則愈。若脉浮小便不利。微熱稍渴。五苓散主之。（正方六十六）微有下之而煩者。仲景云。下之後發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脉沉微者。乾薑附子湯主之。（正七十三）又云。發汗吐下後。虛煩不得眠。心中懊憹者。梔子豉湯主之。（正四十五）發汗若下之。病仍未解。煩燥者茯苓四逆湯主之。（正方七十八）又有病已解而反微煩者。此由病新差。不

勝穀損穀則愈。先用小柴胡湯（正三十九）和其榮衛。以通津液。得屎而解。小柴胡不中。然後以調胃承氣湯。（正方四十三）

（九十五）問下利者

傷寒下利多種。須辨識陰陽。勿令差互。三陽下利則身熱。太陰下利手足溫。少陰厥陰下利。身不熱。以此別之。大抵下利挾太陽脈證。便不得用溫藥。俗醫但見下利。便作陰證。用溫熱藥。鮮不發黃生斑而死也。太陽陽明合病。必下利。葛根湯（正二十六）主之。下利而頭疼腰痛。肌熱目疼鼻乾。是其證也。太陽少陽合病。自下利。黃芩湯主之。（正八十五）若嘔者。黃芩湯加半夏生薑也。（正八六）下利而頭疼胸滿。或口苦咽乾。或往來寒熱而嘔。其脈浮大而弦者。是其證也。陽明少陽合病。必下利。其脈不負者順也。負者失也。互相尅賊。名爲負也。下利而身熱胸脅痛滿乾嘔。或往來寒熱。其脈長大而弦者。是其證也。蓋陽明者土。其脈長大。少陽者木。其脈弦。若合病。土自利不渴屬太陰。四逆湯、（正七十五）理中湯主之。（正七十四）自被木賊。更下利爲胃已困。若脈不弦者順也。爲土不負。負者死。利而渴屬少陰。白通湯。（正九十七）白通加猪膽湯。（正九十八）通脉四逆湯（正八十二）猪苓湯。（正六十七）眞武湯。（正一百五）四逆加人參湯。（正七十七）可檢證而用之。其餘下利。皆因汗下後證也。大抵傷寒下利。須看脈與外證。下利而脈大者虛也。脈微弱者爲自止。下利日十餘行。脈反實者逆。下利脈數而滑者。有宿食也。下之愈。脈遲而滑者實也。其利未得便止。更宜下之。下利三部脈皆平。按其心下硬者急下之。協熱利者。臍下必熱。大便赤黃色。及腸間津汁垢膩。謂之腸垢。寒毒入胃。則臍下必寒。腹脹滿。大便或黃白。或青黑。或下利清穀。濕毒氣盛。則下利腹痛。大便如膿血。或如爛肉汁也。下利欲飲水者。以有熱也。下利讝語者。有燥屎也。寒毒入胃者。四逆湯（正七十五）理中湯、（正七十四）白通湯加附子、（正九十七）四逆散加薤白、（正七十六）主之。協熱利者。黃芩湯、（正八十五）白頭翁湯、（正一百八）三黃熟艾湯、（雜方一百）薤白湯、（雜一百一）赤石脂圓、（雜一百二）濕毒下膿血者。桃花

湯、（正九十九）地楡散、（雜一百三）黃連阿膠散、（雜一百四）雖然自利而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有熱也三陰下利宜温之然少陰自利清水心下痛口乾燥者却宜下之此又不可不知也少陰陰

泄利下重・不可投熱藥・先濃煎薤白湯（雜一百）內四逆散・綠四逆散用枳實芍藥之類・又尋常胃中不和腹中腸鳴下利・生薑瀉心湯最妙・（正六十三）此二法・不特傷寒證也・

（九十六）問小便不利小便難

傷寒發汗後小出多亡津液胃中極乾故小便不利醫見小便不利往往利之誤矣類纂云胃中乾則無小便愼不可利故仲景云下之後復發汗小便不利者亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通脉浮者五苓散（正六十六）脉沉者猪苓湯也（正六七）表不解心下有水發熱而咳小腹滿小便不利者小青龍湯去麻黃加茯苓也（正三十六）傷寒無汗翕翕發熱頭項強痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也（正方九）嘔而發熱胸脅滿心下怔忪小便不利者小柴胡湯去黃芩加茯苓（正二十九）少陰病小便不利者四逆散加茯苓也（正七十六）傷寒有所不利者・行之取其滲泄也・有渴而飲停者・有躁而煩渴者・有病氣去而水氣不得行者・其表裏得見煩躁・口燥欲飲水・水入卽吐・病名水逆・及霍亂頭痛・發熱身疼痛欲飲水者・有發熱汗出・復惡寒不嘔・但心下痞者・並宜五苓散・其脉浮・發熱渴欲飲水・小便不利・少陰病下利六七日・欬而嘔渴・心煩不得眠者・宜與猪苓湯・其大病差後・從腰已下有水氣者・牡蠣澤瀉散・（正九十四）此利水道滲泄之義也・大抵中濕與發黃以利小便爲先陽明汗多以利小便爲戒〇又問小便難何也陰虛故也陰虛者陽必湊之爲陽所湊也故小便黃者中有熱也宜瞿麥滑石之類瀉之太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之（正方六）陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脅下及心痛鼻乾不得汗嗜臥身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓主之（正二十九）

（九十七）問小便自利小便數

太陽證下焦有熱小腹必滿應小便不利而小便反利者下血證也抵當湯主之（正九十一）陽明證自汗出應小便少而小便自利者津液內竭也屎雖硬不可攻也當用蜜煎導之（正百十二）少陰證四逆而小便自利者虛寒證也四逆湯（正七十五）眞武湯去茯苓主之（正百五）○又問小便數者何也腎與膀胱俱虛而有客熱乘之也二經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行澁澁則小便不快故令數起也診其趺陽脈數胃中熱卽消穀引飮大便必硬小便卽數也太陽病自汗四支拘急難以屈伸心煩微惡寒脚攣急若小便數者愼不可行桂枝也宜與甘草乾薑湯（正五十五）芍藥甘草湯也（正五十七）大抵溲數則大便難仲景云趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇卽小便數浮濇相薄大便則鞕其脾爲約麻子仁圓主之（正九十二）太陽病若汗若吐若下後微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯（正四十二）和之愈○又云傷寒脈浮自汗小便數若胃中不和讝語者少與調胃承氣湯（正四十三）

（九十八）問有數日不大便有大便難有大便鞕有燥屎有大便溏

傷寒數日不大便大便鞕及有燥屎皆知用大柴胡（正方三十）大承氣（正四十一）小承氣（正四十二）攻之然仲景論大便不通亦有數種不可攻者（在第三卷十五問中詳言之矣）○仲景又有陽結陰結之論不可不別也其脈浮而數能食不大便此爲實名曰陽結宜用小柴胡湯（正二十九）所謂和其榮衞以通津液續不了了得屎而解也其脈沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結宜用金液丹所謂陽盛則促陰盛則

結促結同也。○又問大便溏者何也。古人云。歲火不及。寒乃大行。民病鶩溏。大率病人腸中有寒。卽大便鴨溏。蓋溏者。胃中冷水穀不別故也。華佗云。寒卽溏。熱卽垢。仲景說初鞕後溏有二證。小便不利。小便少。皆水穀不分耳。

（九十九）問病人默默欲眠。目不能閉。起居不安。其聲嗄或咽乾。（嗄。所訝切。聲破也。）此名狐惑傷寒也。狐惑與濕蟨皆蟲證。初得狀如傷寒。或因傷寒變成其疾。其候默默欲眠。目不能閉。起居不安。蟲蝕其喉爲惑。其聲嗄。蟲食下部爲狐。其咽乾。狐惑之病。並惡飲食。面目乍赤、乍白、乍黑。是其證也。大抵傷寒病腹內熱。入食小腸胃空虛。三蟲行作求食。蝕人五臟及下部爲蠶病。其候齒無色。舌上盡白。甚者脣黑有瘡。四支沈重。忽忽喜眠。蟲蝕其肛。爛見五臟則死。當數看其上下脣。上脣有瘡。蟲食其臟也。下脣有瘡。蟲食其肛也。殺人甚急。多因下利而得。治蟨桃仁湯（雜一百五）黃連犀角湯（雜一百六）雄黃銳散主之。（雜一百七）

（一百）問病人欲食。復不能食。常默默欲臥。復不能臥。欲出行復不能行。飲食或有美時。或有不忤飯時。如強健人而臥不能行。如有寒如無寒。如有熱復無熱。口苦小便赤。藥入卽吐利。

此名百合傷寒也。百脉一宗。悉致其病。無復經絡也。其狀欲食復不能食。常默默欲得臥復不能臥。欲出行復不能行。飲食或有美時。或有不忤飯時。如強健人而臥不能行。如有寒如無寒。如有熱復無熱。口苦小便赤。百合之病。諸藥不治。藥入卽吐利。如有神靈。此多因傷寒虛勞。大病之後不平復。變成斯疾也。百

合知母湯、（雜一百八）滑石代赭湯、（雜一百九）雞子湯、（雜一百十）百合地黃湯、（雜百十一）百合洗方、（雜百十二）栝樓牡蠣散、（雜百十三）滑石散（雜百十四）主之。